

## **Kleine Anfrage**

**des Abgeordneten Dr. Lauerwald (AfD)**

**und**

## **Antwort**

**des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie**

### **Anträge auf Entschädigung wegen Impfschäden aufgrund einer Corona-Schutzimpfung in Thüringen**

Das **Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie** hat die **Kleine Anfrage 7/3562** vom 5. Juli 2022 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 10. August 2022 beantwortet:

1. Wie viele Anträge auf Entschädigung wurden nach § 60 Infektionsschutzgesetz (IfSG) wegen einer gesundheitlichen Schädigung im Zusammenhang mit einer Corona-Schutzimpfung bis zum 30. Juni 2022 im Freistaat Thüringen gestellt (bitte mit Angabe des verwendeten Impfstoffs, des Zeitpunkts der Impfung, der Anzahl der erhaltenen Corona-Schutzimpfungen, Datum der Antragstellung und des Bescheids, Alter, Geschlecht und geltend gemachten Gesundheitsstörung)?

Antwort:

Bis zum 30. Juni 2022 wurden insgesamt 139 Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens infolge einer Corona-Schutzimpfung nach § 60 Infektionsschutzgesetz (IfSG) gestellt. Die Anträge wurden von 82 Antragstellerinnen und 57 Antragstellern gestellt. Die weiteren Daten sind in der beigefügten Übersicht enthalten (Anlage 1).

Die gewünschten Daten hinsichtlich des Zeitpunktes der Impfung und der Anzahl der erhaltenen Corona-Schutzimpfungen werden statistisch nicht erfasst.

2. Wie viele dieser Anträge wurden bereits beschieden (bitte um Angabe der bewilligten sowie der abgelehnten Anträge)?

Antwort:

Es wurden bisher über 21 Anträge entschieden. Bei fünf Anträgen kam es zu einer Anerkennung. In 16 Fällen liegt eine Ablehnung vor (siehe Anlage 1).

3. Auf wie viele unmittelbar geschädigte Personen gehen die eingegangenen Anträge auf Entschädigung nach § 60 IfSG zurück (bitte mit Angabe zum Alter und Geschlecht)?

Antwort:

Von den 139 Anträgen wurden 135 Anträge durch Antragsteller/-innen gestellt, die einen unmittelbaren Gesundheitsschaden infolge der Impfung geltend machen. Vier Anträge wurden von Hinterbliebenen gestellt. Das jeweilige Geschlecht und Alter ist ebenfalls der Anlage 1 zu entnehmen.

4. Anhand welcher Kriterien wird die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs zur Anerkennung beziehungsweise Ablehnung eines Gesundheitsschadens als Folge einer Corona-Schutzimpfung (§ 61 IfSG) festgestellt?

Antwort:

Die Prüfung im Hinblick auf das Vorliegen eines mit Wahrscheinlichkeit bestehenden ursächlichen Zusammenhangs zwischen schädigendem Vorgang (hier: Impfung) und der zu beurteilenden Gesundheitsstörung erfolgt auf der Grundlage der Anlage "Versorgungsmedizinische Grundsätze" zur Verordnung zur Durchführung des § 1 Abs. 1 und 3, des § 30 Abs. 1 und des § 35 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes (Versorgungsmedizin-Verordnung - VersMedV), herausgegeben vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Die diesbezüglich besonders zu berücksichtigenden Kriterien finden sich im Teil C - Begutachtung im sozialen Entschädigungsrecht - der Versorgungsmedizinischen Grundsätze, Kapitel C 1 bis C 12 (Anlage 2). Aktuell wird die Versorgungsmedizin-Verordnung durch den Bund überarbeitet. Darüber hinaus wurde die Arbeitsgruppe "Covid 19-Impfschäden" gegründet, der leitende Ärztinnen und Ärzte der Länder und der Bundeswehr sowie einige Versorgungsärztinnen und -ärzte, die mit den entsprechenden Gutachten befasst sind, angehören. Der Austausch in dieser Arbeitsgruppe findet alle vier bis sechs Wochen statt. Die Gutachten werden anonymisiert gesammelt und in der Arbeitsgruppe ausgewertet. Zu folgenden Diagnosen wurden Unterarbeitsgruppen eingerichtet: Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung, Sinusvenenthrombosen, Thrombosen und Thrombozytopeniesyndrom, Guillain-Barré-Syndrom, Fazialisparese. In Planung ist die Unterarbeitsgruppe Vaskulitiden (Stand April 2022).

Ziel ist es, einheitliche Bewertungsmaßstäbe, insbesondere zur Frage der Kausalität, zu entwickeln. Die Einrichtung einer zentralen Datenbank, auf die jeder Gutachter Zugriff haben soll, wird angestrebt.

In Vertretung

Feierabend  
Staatssekretärin

Anlagen\*

#### Endnote:

- \* Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet. Ein Exemplar der Antwort der Landesregierung mit Anlagen erhielten jeweils vorab der Fragesteller, die Fraktionen sowie die Parlamentarischen Gruppen. In der Landtagsbibliothek liegt diese Drucksache mit Anlagen zur Einsichtnahme bereit. Des Weiteren kann sie unter der oben genannten Drucksachennummer im Abgeordneteninformationssystem sowie im Internet unter der Adresse: [www.parldok.thueringen.de](http://www.parldok.thueringen.de) eingesehen werden.

## IfSG-Erstanträge Corona-Schutzimpfung 2021-2022 (Stand der Anträge 30.06.2022)

Anlage 1 zur KA 3562

lfd. Nummer	Geschlecht	Eingang	Alter	Witwe/Waise	Impfgrund	Impfstoff	Angegebene Schädigung	Entscheidung
1	männlich	13.04.2021	56		Covid-19	AstraZeneca	Sinusvenenthrombose	Anerkennung 08/2021
2	weiblich	26.05.2021	59		Covid-19	Biontech-Pfizer	multiple, attackenartig auftretende Schmerzen insbesondere in Kopf- und Lendenwirbelsäulenbereich	Ablehnung 11/2021
3	männlich	26.05.2021	61		Covid-19	AstraZeneca	Verringerung Sehvermögen	
4	weiblich	02.06.2021	86		Covid-19	Biontech-Pfizer	Gürtelrose	
5	männlich	07.06.2021	73		Covid-19	AstraZeneca	Blutdruck, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Herzrasen	
6	männlich	15.06.2021	44		Covid-19	Biontech-Pfizer	transverse Myelitis (Anm.: neuroimmunologische Erkrankung, bei der es zur Entzündung des Rückenmarks kommt)	Anerkennung 04/2022
7	männlich	01.07.2021	80		Covid-19	Biontech-Pfizer	Verschlechterung Sehvermögen	Ablehnung 02/2022
8	weiblich	21.07.2021	33		Covid-19	Biontech-Pfizer	CRPS-Arm (Anm.: Komplexes regionales Schmerzsyndrom - es werden Gebiete im Hirn, die die erkrankte Extremität (Arm oder Bein) versorgen, kleiner)	Ablehnung 07/2022
9	weiblich	26.07.2021	84		Covid-19	AstraZeneca	Schlaganfall	
10	weiblich	26.07.2021	44		Covid-19	AstraZeneca	Milzinfarkt	Anerkennung 02/2022
11	männlich	28.07.2021	69		Covid-19	AstraZeneca	Hurst-Enzephalitis (Anm.: seltene, akut entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems)	Anerkennung 05/2022
12	weiblich	05.08.2021	53	Witwe	Covid-19	AstraZeneca	Witwenantrag, Ehemann verstorben an Sinusvenenthrombose	Anerkennung 05/2022
13	weiblich	25.08.2021	25		Covid-19	Biontech-Pfizer	Retrobulbarneuritis (Anm.: entzündliche Erkrankung des Sehnervs, d. h. des zweiten Hirnnervs), Erstmanifest. MS	Ablehnung 07/2022
14	weiblich	20.08.2021	33		Covid-19	Biontech-Pfizer	paroxysmale Tachykardie (Anm.: Herzrhythmusstörung)	Ablehnung 02/2022
15	weiblich	31.08.2021	65		Covid-19	Biontech-Pfizer	Epilepsie	Ablehnung 04/2022
16	männlich	16.09.2021	58		Covid-19	Biontech-Pfizer	Thrombose Auge	Ablehnung 02/2022
17	weiblich	21.09.2021	58		Covid-19	Biontech-Pfizer	Postzoster-Neuralgie (Anm.: starke Nervenschmerzen) / postvaksinale Reaktivierung der Variezella-zoster-Infektion (Anm.: Gürtelrose)	Ablehnung 02/2022
18	männlich	22.09.2021	67		Covid-19	Biontech-Pfizer	Herzmuskelentzündung	
19	weiblich	29.09.2021	59		Covid-19	Johnson	Gesichtslähmung	Ablehnung 06/2022
20	weiblich	06.10.2021	52		Covid-19	Biontech-Pfizer	Missempfindungen im Körper	Ablehnung 03/2022
21	männlich	22.10.2021	60		Covid-19	Biontech-Pfizer	Herpes Zoster (Impfarm)	Ablehnung 07/2022
22	männlich	18.10.2021	37		Covid-19	Johnson	GBS	Ablehnung 05/2022
23	weiblich	02.11.2021	56		Covid-19	Biontech-Pfizer	Myelitis	
24	weiblich	01.11.2021	45		Covid-19	Biontech-Pfizer	Lähmung der Beine/spinale Ischämie A. spinale, anterior Syndrom	Ablehnung 02/2022
25	männlich	08.11.2021	39		Covid-19	AstraZeneca/Biontech-Pfizer	Hörsturz, Schmerzen in Beinen	Ablehnung 05/2022
26	weiblich	08.11.2021	48		Covid-19	Biontech-Pfizer	bronchiales Asthma	
27	männlich	17.11.2021	33		Covid-19	Moderna	GBS	
28	weiblich	23.11.2021	44		Covid-19	Biontech-Pfizer	Kollagenose	Ablehnung 06/2022
29	männlich	30.11.2021	63		Covid-19	Biontech-Pfizer	Polyneuropathie, Zervikobrachialsyndrom	Ablehnung 05/2022
30	weiblich	06.12.2021	49		Covid-19	AstraZeneca/Biontech-Pfizer	Kollagenose, Reynaud-Syndrom	
31	männlich	14.12.2021	27		Covid-19	bisher nicht angegeben	latente schmerzgetriggerte sensomotorische Armparese links	
32	männlich	27.12.2021	64		Covid-19	Biontech-Pfizer	Herzinfarkt und Folgeerkrankungen	
33	weiblich	05.01.2022	40		Covid-19	Biontech-Pfizer	Long-COVID Syndrom nach Impfung	
34	männlich	10.01.2022	34		Covid-19	Biontech-Pfizer	Alopecia areata	
35	weiblich	20.01.2022	61		Covid-19	AstraZeneca	Hirnblutung, Kopfschmerzen, Konzentrations-, Stimmungsschwankungen	
36	männlich	20.01.2022	32		Covid-19	Moderna	Myokarditis, Herzarrhythmie	
37	männlich	26.01.2022	64		Covid-19	Biontech-Pfizer	Thrombose, Lungenembolie, erhöhter Blutdruck	
38	männlich	31.01.2022	51		Covid-19	Moderna	Belastungsasthma	
39	männlich	02.02.2022	45		Covid-19	Biontech-Pfizer	Thrombose Bein	
40	weiblich	01.02.2022	81		Covid-19	Biontech-Pfizer	Atemnot, heisere und krachende Stimme, starkes Schwitzen, Bluthochdruck, Schmerzen in Arm, Schultern, Nacken und Beinen	
41	weiblich	02.02.2022	77		Covid-19	AstraZeneca	Verlust der Sehkraft rechtes Auge	
42	weiblich	07.02.2022	50		Covid-19	Biontech-Pfizer	Sensibilitätsstörungen beider Füße und Unterschenkel, z. n. Myelitis, starke Schmerzen und Beeinträchtigung beider Beine	
43	weiblich	07.02.2022	54		Covid-19	Biontech-Pfizer	Müdigkeits- und Erschöpfungssyndrom, Gelenkschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, starkes Schwitzen, Parästhesien Arme und Beine, Übelkeit	
44	männlich	07.02.2022	15		Covid-19	Biontech-Pfizer	Diabetes Mellitus Typ 1	
45	weiblich	07.02.2022	75		Covid-19	Biontech-Pfizer	Bewegungseinschränkungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Bluthochdruck	
46	weiblich	07.02.2022	53		Covid-19	Biontech-Pfizer	Schlaganfall, Bluthochdruck	

47	weiblich	07.02.2022	50		Covid-19	Moderna	juckender und brennender Ausschlag, Taubheitsgefühl im Mund, Schweißausbrüche, Müdigkeit, Schlaptheit	
48	weiblich	07.02.2022	40		Covid-19	Biontech-Pfizer	Depressionen	
49	männlich	04.02.2022	77		Covid-19	Biontech-Pfizer	Stammganglienfarkt rechts, arterielle Hypertonie	
50	männlich	04.02.2022	71		Covid-19	Moderna	Schmerzen Einstichstelle, Schultergelenk und Hand	
51	männlich	03.02.2022	44		Covid-19	AstraZeneca/Biontech-Pfizer	CIDP, Guillain-Barré-Syndrom	
52	weiblich	04.02.2022	77		Covid-19	Biontech-Pfizer	Taubheit Füße/Beine, Muskelschwäche, Koordinationsprobleme	
53	weiblich	08.02.2022	82		Covid-19	Biontech-Pfizer	Gürtelrose, Bakerzyste	
54	weiblich	08.02.2022	38		Covid-19	Johnson	Glieder-, Kopfschmerzen, Bluthochdruck	
55	männlich	08.02.2022	43		Covid-19	Moderna/Biontech-Pfizer	Tinnitus, Drehschwindel, Bluthochdruck	
56	weiblich	09.02.2022	74		Covid-19	Biontech-Pfizer	Arteriitis (Erblindung Auge links)	
57	männlich	09.02.2022	62		Covid-19	Moderna	Urtikaria	
58	männlich	09.02.2022	56		Covid-19	Biontech-Pfizer	vorderwandinfarkt, akuter Hinterwandinfarkt, arterielle Hypertonie, Angststörungen/Depression, koronare 3-Gefäßerkrankung	
59	weiblich	07.02.2022	44		Covid-19	Moderna	Gelenkprobleme und -schmerzen	
60	männlich	08.02.2022	64		Covid-19	Biontech-Pfizer	Einbruch der Lungenfunktion, Abstoßungsreaktion/chronisches Transplantatversagen	
61	weiblich	08.02.2022	41		Covid-19	Biontech-Pfizer	Schwindel, Bluthochdruck, Benommenheit, nicht mehr belastbar, Schlafstörungen	
62	männlich	10.02.2022	77		Covid-19	AstraZeneca	Autoimmunenzephalitis, Konzentrationsschwierigkeiten, Erschöpfung, Vergesslichkeit, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen, Verschlechterung Sehkraft, Verlust des Geruchsinns	
63	männlich	14.02.2022	70		Covid-19	Johnson	schwerer Lungenschaden	
64	weiblich	14.04.2022	82		Covid-19	Biontech-Pfizer	Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Hautausschlag, Haarausfall, Schuppenflechte	
65	weiblich	10.02.2022	66		Covid-19	Biontech-Pfizer	Abgeschlagenheit, Übelkeit, Verschlechterung Lymphödem, Luftknappheit	
66	männlich	15.02.2022	66		Covid-19	Moderna	Herzinfarkt und Folgeerkrankungen	
67	männlich	15.02.2022	66		Covid-19	Moderna/Biontech-Pfizer	Thrombose, Myokarditis	
68	weiblich	15.02.2022	44		Covid-19	Biontech-Pfizer	Verschlechterung der bereits bestehenden MS, Verminderung Sehvermögen	
69	weiblich	16.02.2022	59		Covid-19	Johnson	Herzkrankung, Kardiomyopathie	
70	weiblich	16.02.2022	55		Covid-19	Moderna/Biontech-Pfizer	Polyneuropathie	
71	männlich	16.02.2022	54		Covid-19	Johnson	Thrombosen in Milz und Pfortader	
72	weiblich	16.02.2022	56		Covid-19	Moderna/Biontech-Pfizer	Muskelerkrankung, linkes Bein und linker Arm	
73	weiblich	17.02.2022	55		Covid-19	Biontech-Pfizer	Autoimmunerkrankung Morbus Basedow	
74	männlich	16.02.2022	19		Covid-19	AstraZeneca	aplastische Anämie, Thrombozytopenie	
75	weiblich	21.02.2022	39		Covid-19	Biontech-Pfizer	Konzentrationsstörungen, Erinnerungsdefizite, Gleichgewichtsstörung, Hemiparese rechts	
76	weiblich	22.02.2022	70		Covid-19	Biontech-Pfizer	Tinnitus	
77	männlich	22.02.2022	62		Covid-19	AstraZeneca/Biontech-Pfizer	Verschlechterung des Sehvermögens	
78	weiblich	22.02.2022	51		Covid-19	Biontech-Pfizer	Bluthochdruck, Luftbeschwerden, Angstzustände, Krämpfe im Körper, Kopfschmerzen, Zuckungen und Verkrampfungen, Kreislaufprobleme, Augenprobleme, Abgeschlagenheit	
79	weiblich	23.02.2022	53		Covid-19	Biontech-Pfizer	Lungenembolie	
80	männlich	23.02.2022	45		Covid-19	Moderna/Biontech-Pfizer	schwere aplastische Anämie	
81	weiblich	25.02.2022	40	Witwe	Covid-19	AstraZeneca	Witwenantrag, Ehemann verstorben an Sinusvenenthrombose	
82	weiblich	25.02.2022	40		Covid-19	Biontech-Pfizer	Parästhesien im Gesicht, Arme/Hände, Beine/Füße, chronische Urtikaria, Flush-Symptomatik im Gesicht	
83	männlich	28.02.2022	59		Covid-19	Biontech-Pfizer	Verschlechterung des Sehvermögens	
84	weiblich	28.02.2022	58		Covid-19	Biontech-Pfizer	Sinusvenenthrombose, Hyperthyreose bei Morbus Basedow und Struma nodosa	
85	weiblich	02.03.2022	54		Covid-19	Biontech-Pfizer	Guillain-Barré-Syndrom	
86	weiblich	02.03.2022	57		Covid-19	Biontech-Pfizer	Herzrasen, hoher Puls, Atemnot, geringfügige Belastung, Übelkeit, körperliche Schwäche, Müdigkeit, Schlaflosigkeit	
87	männlich	03.03.2021	83		Covid-19	Biontech-Pfizer	Hirnfarkt (Schlaganfall) mit Hirnblutung	
88	männlich	02.03.2022	66		Covid-19	Biontech-Pfizer	Bluthochdruck, geringe Belastbarkeit	
89	weiblich	02.03.2022	34		Covid-19	Biontech-Pfizer	Sensibilitätsstörungen der Füße und Hände	
90	weiblich	03.03.2022	56		Covid-19	Biontech-Pfizer	Gesichtslähmung, Taubheit rechter Unterschenkel, Schwindelgefühl, Hautausschlag	
91	männlich	22.04.2021	71		Covid-19	Moderna	Gelenkschmerzen	
92	weiblich	07.03.2022	56		Covid-19	Biontech-Pfizer	Muskelschmerzen, Muskelschwäche, Konzentrationsprobleme, Schwindel, Erschöpfung, Müdigkeit	
93	weiblich	16.03.2022	42		Covid-19	Biontech-Pfizer	Multiple Sklerose	
94	männlich	14.03.2022	44		Covid-19	Biontech-Pfizer	Urtikaria	
95	männlich	08.03.2022	66		Covid-19	Biontech-Pfizer	Herzstörung, Hautausschlag, Schwächeanfälle, Taubheitsgefühl in den Händen	
96	weiblich	10.03.2022	46		Covid-19	Biontech-Pfizer	Schwindel, Kreislaufprobleme, Bluthochdruck, Extrasystolen	
97	männlich	15.03.2022	30		Covid-19	Biontech-Pfizer	Perikarditis, Herzrasen, Luftnot, Kopfschmerzen, Schwindel	

98	weiblich	16.03.2022	61		Covid-19	Biontech-Pfizer	Gesichtslähmung, Taubheitsgefühl in Armen, Beinen und Füßen, Augenerkrankung	
99	weiblich	17.03.2022	62		Covid-19	AstraZeneca	Zentralvenenverschluss rechtes Auge	
100	weiblich	23.03.2022	53		Covid-19	Biontech-Pfizer	bisher keine Angaben	
101	weiblich	10.03.2022	57	Witwe	Covid-19	Biontech-Pfizer	Witwenantrag; Ehemann verst. 04.08.2021, an septischem Schock, Mesenterialschämie	
102	weiblich	10.03.2022	16	Waise	Covid-19	Biontech-Pfizer	Waisenantrag; Vater verst. 04.08.2021, an septischem Schock, Mesenterialschämie	
103	weiblich	23.03.2022	66		Covid-19	Biontech-Pfizer	chronische, stoßartig auftretende Kopfschmerzen	
104	weiblich	23.03.2022	65		Covid-19	AstraZeneca	Schwellungen am ganzen Körper und in den Gelenken, Kopfschmerzen	
105	weiblich	23.03.2022	65		Covid-19	AstraZeneca	chron. Polyneuropathie, sensomotorische Parese der Beine	
106	weiblich	09.07.2021	38		Covid-19	Moderna	Herz- Kreislauf-Störungen, Schmerzen in der Brust	
107	weiblich	25.03.2022	54		Covid-19	Biontech-Pfizer	Nervenlähmung rechte Gesichtshälfte und rechter Arm	
108	männlich	25.03.2022	55		Covid-19	Johnson	akute Polyradikuloneuritis mit myopathischer Komponente	
109	weiblich	30.03.2022	66		Covid-19	Biontech-Pfizer	Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Luftnot, Herzrhythmusstörungen, Nerven- und Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen	
110	weiblich	31.03.2022	71		Covid-19	Biontech-Pfizer	Myelopathie, Restless-Legs-Syndrom	
111	männlich	05.04.2022	63		Covid-19	Biontech-Pfizer	Perimyokarditis, chron. Nerveninsuffizienz	
112	weiblich	06.04.2022	41		Covid-19	Biontech-Pfizer	kognitive Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit, Konzentration, Mystik	
113	männlich	06.04.2022	56		Covid-19	Johnson	Zehenamputation, Deformierung beider Füße, Schmerzen, Stimmungsschwankungen	
114	männlich	11.04.2022	55		Covid-19	Biontech-Pfizer	Großgefäßvaskulitis	
115	männlich	08.04.2022	46		Covid-19	Biontech-Pfizer	Dermatitis	
116	weiblich	12.04.2022	44		Covid-19	Biontech-Pfizer	Thrombose	
117	männlich	12.04.2022	59		Covid-19	Biontech-Pfizer	Bläschenbildung an Bein und Rücken, Nervenschmerzen, Schwächegefühl, Kraftlosigkeit, Lippenherpes	
118	weiblich	14.04.2022	60		Covid-19	Moderna	geschwächtes Immunsystem, verminderte Leistungsfähigkeit, starke Gliederschmerzen, Erkältungssymptome	
119	männlich	22.04.2022	37		Covid-19	Moderna	Fasziaparese links mit anhaltender Schädigung der Nerven, der Senkkräft und der Geschmacksnerven, Störung des Hörsystems, Schluckbeschwerden, Kopfschmerzen	
120	männlich	27.04.2022	36		Covid-19	Moderna	Belastungsinsuffizienz mit Herzrasen, Schwindel, Ermüdung	
121	männlich	02.05.2022	38		Covid-19	Biontech-Pfizer	vakzininduzierte Thrombozytose	
122	weiblich	04.05.2022	54		Covid-19	Biontech-Pfizer	Sensibilitätsstörungen Beine, Füße, Haut; Taubheit Genital- und Analbereich	
123	männlich	05.05.2022	53		Covid-19	Johnson	v.A. Sinusvenenthrombose	
124	männlich	09.05.2022	58		Covid-19	Biontech-Pfizer	Polymyalgia Rheumatica	
125	männlich	09.05.2022	29		Covid-19	Biontech-Pfizer	Myokarditis, Palpitationen	
126	weiblich	09.05.2022	69		Covid-19	Biontech-Pfizer	Rheuma	
127	weiblich	06.05.2022	53		Covid-19	Biontech-Pfizer	Myokarditis, Sarkoidose	
128	weiblich	13.05.2022	63		Covid-19	Moderna/Biontech-Pfizer	Taubheit und Missempfindungen in Armen, Händen, Beinen und Füßen	
129	weiblich	29.06.2021	69		Covid-19	Biontech-Pfizer	Gangunsicherheit, Schwindel, Kopfschmerzen, Immobilität	
130	weiblich	04.01.2022	34		Covid-19	Biontech-Pfizer	Atemnot, Herzrasen, Erschöpfung, Brustschmerzen, Müdigkeit, depressive Phasen	
131	weiblich	06.01.2022	56		Covid-19	Biontech-Pfizer	Muskel- und Gelenkschmerzen, Nervenentzündung	
132	weiblich	15.06.2021	68		Covid-19	AstraZeneca	einseitige, persistierende Schmerzen im Genitalbereich	
133	männlich	12.01.2022	21		Covid-19	Biontech-Pfizer	Myokarditis	
134	weiblich	09.06.2022	47		Covid-19	Biontech-Pfizer	Fatigue-Syndrom	
135	männlich	14.06.2022	56		Covid-19	Johnson, Biontech-Pfizer	PAVK, rechts	
136	weiblich	27.06.2022	55		Covid-19	Biontech-Pfizer	Aktivierung einer Gutteirosemrektion, Geruchsstörung am Kopf, Haarausfall, Schuppung, Übelkeit, Gewichtsabnahme	
137	weiblich	29.06.2022	62		Covid-19	Biontech-Pfizer	Myokarditis	
138	weiblich	29.06.2022	76		Covid-19	Biontech-Pfizer	stark erhöhter Ruhepuls, Kreislaufprobleme, Hör- und Augenprobleme, Gedächtnisverlust	
139	weiblich	30.06.2022	85		Covid-19	Moderna/Biontech-Pfizer	Muskelerntzündung in Oberschenkel und Hüfte, schmerzhaft geschwollene Fußgelenke, Erschöpfung, Müdigkeit, Angstzustände, Konzentrationsschwäche und Gelenkschmerzen im linken Oberarm	



Bundesministerium  
für Arbeit und Soziales

# VERSORGUNGS- MEDIZIN- VERORDNUNG

– *VersMedV* –

Versorgungsmedizinische Grundsätze

# **Versorgungsmedizin- Verordnung – VersMedV –**

Versorgungsmedizinische  
Grundsätze





## Einleitung

---

Das Ausmaß einer nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) auszugleichenden Schädigungsfolge und der Grad der Behinderung gemäß Neunten Buch Sozialgesetzbuch wurden bis zum 31.12.2008 nach den „Anhaltspunkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGB IX)“ – AHP – festgestellt. Die älteste Begutachtungsrichtlinie, die den Namen „Anhaltspunkte“ trägt, wurde 1916 „auf Grund von Beratungen des wissenschaftlichen Senats bei der Kaiser-Wilhelm-Akademie“ verfasst, 1920 erweitert und seither vom jeweiligen für Arbeit bzw. Soziales zuständigen Ministerium herausgegeben. Zunächst waren die Anhaltspunkte nur auf „das Versorgungswesen“, d.h. vor allem auf die Begutachtung von Kriegsopfern anzuwenden, seit 1974 galten sie auch für die Begutachtungen nach dem Schwerbehindertengesetz und trugen seit 1983 den Titel „Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertenrecht“ (AHP).

Nach der Rechtsprechung handelte es sich bei den AHP um antizipierte Sachverständigengutachten. Ihre darüberhinausgehende Beachtlichkeit ergab sich zum einen daraus, dass sie eine dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz entsprechende Rechtsanwendung gewährleisteten und zum anderen daraus, dass sie ein geeignetes und auf jahrzehntelanger Erfahrung der Verwaltung und der medizinischen Wissenschaft beruhendes Beurteilungsgefüge darstellten.

Allerdings hatte die Rechtsprechung (Bundesverfassungsgericht, Bundessozialgericht) wiederholt gerügt, dass die AHP nicht demokratisch legitimiert wären. Weder für die AHP selbst noch für die Organisation, das Verfahren und die Zusammensetzung des beratenden Expertengremiums gab es eine Rechtsgrundlage im Sinne eines materiellen Gesetzes.

Durch das Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904) wurde § 30 Absatz 17 BVG eingefügt und damit die geforderte Ermächtigungsgrundlage geschaffen, die dann durch eine Rechtsverordnung konkretisiert wurde. Nach § 152 SGB IX gelten die Maßstäbe auch für die Feststellung weiterer gesundheitlicher Merkmale, die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Rechten und Nachteilsausgleichen sind.

Die Anlage „Versorgungsmedizinische Grundsätze“ umfasst die vom unabhängigen Ärztlichen Sachverständigenbeirat Versorgungsmedizin gefassten und veröffentlichten Beschlüsse und Empfehlungen und spiegelt somit den aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Stand der Versorgungsmedizin wider. Konkret handelt es sich dabei um

- Grundsätze zur versorgungsmedizinischen Bewertung von Schädigungsfolgen, Grundsätze zur Feststellung des Grades der Schädigungsfolgen

- Grundsätze für die Anerkennung einer Gesundheitsstörung nach § 1 Abs. 3 BVG
- Kriterien für die Bewertung der Hilflosigkeit und der Stufen der Pflegezulage nach § 35 Abs. 1 BVG
- Grundsätze zur medizinischen Bewertung des Grades der Behinderung und Kriterien zur Ermittlung des Gesamt-GdS
- Nachteilsausgleiche nach Teil 3 SGB IX

Rechtsgrundlagen aus anderen Rechtsgebieten sind in einer Verordnung des Bundesministeriums nicht zu wiederholen, weshalb Regelungen zu einigen Merkzeichen und Nachteilsausgleichen nicht (mehr) Gegenstand der Verordnung sind.

Es wurde durch die Verordnung sichergestellt, dass eine Fortentwicklung und Anpassung der „Versorgungsmedizinischen Grundsätze“ ausschließlich aus medizinisch-wissenschaftlichen Gründen erfolgt. Änderungen der Verordnung erfolgten durch Artikel 18 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) und Artikel 18 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541). Änderungen in Teil A und B der Anlage zur Verordnung erfolgten durch fünf Änderungsverordnungen, die Änderung des Teils C durch Artikel 26 des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechtes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) und die Streichung der Nummer 3 in Teil D durch Artikel 18 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234).

Die „Anhaltspunkte“ hatten den Wechsel zum bio-psycho-sozialen Modell der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)“ vor Erscheinen des SGB IX schon 1983 – in Kenntnis der Diskussionen auf internationaler Ebene und zu den Vorarbeiten zum SGB IX – vollzogen. Allerdings war es auf Grund besonderer gesetzlicher Vorgaben nicht möglich, dieses Modell in den Anhaltspunkten überall konsequent umzusetzen. Dies ist Aufgabe des neuen, durch die Verordnung legitimierten Beirats.

Die „Versorgungsmedizinischen Grundsätze“ dienen den versorgungsrätlichen Gutachtern als verbindliche Norm für eine sachgerechte, einwandfreie und bei gleichen Sachverhalten einheitliche Bewertung der verschiedensten Auswirkungen von Gesundheitsstörungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung einer sachgerechten Relation untereinander. Nach wie vor sollen und können die „Versorgungsmedizinischen Grundsätze“ kein medizinisches Lehrbuch oder Handbuch für Antragstellerinnen und Antragsteller darstellen oder ersetzen; sie können auch nicht alle Sachverhalte beschreiben.

Die „Versorgungsmedizinischen Grundsätze“ werden dem Benutzerkreis weiterhin sowohl in Buchform als auch als Download von der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ([www.bmas.bund.de](http://www.bmas.bund.de)) zugänglich sein.

# Inhaltsübersicht

1. Versorgungsmedizin-Verordnung – VersMedV (Stand: 1. Januar 2020) .....	7
2. Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung „Versorgungsmedizinische Grundsätze“ .....	9
3. Abkürzungsverzeichnis .....	130
4. Stichwortverzeichnis .....	131
5. Bürgertelefon .....	141
6. Impressum .....	142



**Versorgungsmedizin-Verordnung – VersMedV  
(Stand: 1. Januar 2020)**

**§ 1**

**Zweck der Verordnung**

Diese Verordnung regelt die Grundsätze für die medizinische Bewertung von Schädigungsfolgen und die Feststellung des Grades der Schädigungsfolgen im Sinne des § 30 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes, für die Anerkennung einer Gesundheitsstörung nach § 1 Abs. 3 des Bundesversorgungsgesetzes, die Kriterien für die Bewertung der Hilflosigkeit und der Stufen der Pflegezulage nach § 35 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes und das Verfahren für deren Ermittlung und Fortentwicklung.

**§ 2**

**Anlage „Versorgungsmedizinische Grundsätze“**

Die in § 1 genannten Grundsätze und Kriterien sind in der Anlage zu dieser Verordnung als deren Bestandteil festgelegt. Die Anlage wird auf der Grundlage des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft unter Anwendung der Grundsätze der evidenzbasierten Medizin erstellt und fortentwickelt.

**§ 3**

**Beirat**

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein unabhängiger „Ärztlicher Sachverständigenbeirat Versorgungsmedizin“ (Beirat) gebildet, der das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu allen versorgungsärztlichen Angelegenheiten berät und die Fortentwicklung der Anlage entsprechend dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft und versorgungsmedizinischer Erfordernisse vorbereitet.

(2) Der Beirat hat 17 Mitglieder, und zwar

1. acht versorgungsmedizinisch besonders qualifizierte Ärztinnen oder Ärzte,
2. eine Ärztin oder einen Arzt aus dem versorgungsärztlich-gutachtlichen Bereich der Bundeswehr,
3. acht wissenschaftlich besonders qualifizierte Ärztinnen oder Ärzte versorgungsmedizinisch relevanter Fachgebiete.

(3) Zu den Beratungen des Beirats können externe ärztliche Sachverständige sowie sachkundige ärztliche Vertreter von Behindertenverbänden hinzugezogen werden. Es können Arbeitsgruppen gebildet werden.

(4) Die Mitglieder des Beirats werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales für die Dauer von vier Jahren berufen. Wiederwahl ist möglich. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist berechtigt, Beiratsmitglieder jederzeit ohne Angabe von Gründen abuberufen. Ein Beiratsmitglied kann jederzeit seine Abberufung beantragen. Dem Antrag ist stattzugeben. Nach Ausscheiden eines Mitglieds erfolgt eine Neuberufung für den restlichen Zeitraum der Berufungsperiode. Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung und bestimmt durch Wahl aus seiner Mitte den Vorsitz und die Stellvertretung. Die Geschäftsführung des Beirats liegt beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales, welches zu den Sitzungen einlädt und im Einvernehmen mit dem vorsitzenden Mitglied die Tagesordnung festlegt.

(5) Die Beratungen des Beirats sind nicht öffentlich. Die Mitgliedschaft im Beirat ist ein persönliches Ehrenamt, das keine Vertretung zulässt. Die Mitglieder des Beirats unterliegen keinerlei Weisungen, üben ihre Tätigkeit unabhängig und unparteilich aus und sind nur ihrem Gewissen verantwortlich. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet; dies gilt auch für die in Absatz 3 genannten Personen.

(6) Die Verbände von Menschen mit Behinderungen und Berechtigten nach dem sozialen Entschädigungsrecht auf Bundesebene erhalten ein Mitberatungsrecht im Beirat. Der Deutsche Behindertenrat benennt dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales hierzu zwei sachverständige Personen für den Zeitraum der Berufungsperiode des Beirats. Er berücksichtigt dabei die Anliegen von Verbänden, die die Belange von Berechtigten nach dem sozialen Entschädigungsrecht vertreten, auch soweit sie nicht Mitglieder des Deutschen Behindertenrates sind. Das Mitberatungsrecht beinhaltet auch das Recht zur Anwesenheit bei der Beschlussfassung. Absatz 5 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Die Geschäftsordnung des Beirats gilt auch für die vom Deutschen Behindertenrat benannten Personen.

#### **§ 4**

#### **Beschlüsse**

Die Beschlüsse des Beirats werden mit einfacher Mehrheit der nach § 3 Absatz 2 berufenen Mitglieder gefasst.

**Anlage zu § 2 der  
Versorgungsmedizin-Verordnung**

„Versorgungsmedizinische Grundsätze“





# Inhaltsverzeichnis

## Teil A

### Allgemeine Grundsätze

---

1. Schädigungsfolgen .....	15
2. Grad der Schädigungsfolgen (GdS), Grad der Behinderung (GdB) .....	15
3. Gesamt-GdS .....	17
4. Hilflosigkeit .....	19
5. Besonderheiten der Beurteilung der Hilflosigkeit bei Kindern und Jugendlichen .....	20
6. Blindheit und hochgradige Sehbehinderung .....	24
7. Wesentliche Änderung der Verhältnisse .....	25

## Teil B

### GdS-Tabelle

---

1. Allgemeine Hinweise zur GdS-Tabelle .....	29
2. Kopf und Gesicht .....	30
3. Nervensystem und Psyche .....	31
4. Sehorgan .....	41
5. Hör- und Gleichgewichtsorgan .....	45
6. Nase .....	51
7. Mundhöhle, Rachenraum und obere Luftwege .....	52
8. Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen .....	56
9. Herz und Kreislauf .....	59
10. Verdauungsorgane .....	63
11. Brüche (Hernien) .....	72
12. Harnorgane .....	73
13. Männliche Geschlechtsorgane .....	77
14. Weibliche Geschlechtsorgane .....	79

15. Stoffwechsel, innere Sekretion .....	82
16. Blut, blutbildende Organe, Immunsystem .....	85
17. Haut .....	91
18. Haltungs- und Bewegungsorgane, rheumatische Krankheiten .....	95

## Teil C

### Begutachtungen im Sozialen Entschädigungsrecht

---

1. Grundsätze zur Begutachtung im Sozialen Entschädigungsrecht .....	115
2. Tatsachen für die Begutachtung des ursächlichen Zusammenhangs .....	115
3. Ursächlicher Zusammenhang .....	116
4. Kann-Versorgung .....	117
5. Anerkennung der Schädigungsfolge im Sinne der Entstehung und Anerkennung der Schädigungsfolge im Sinne der Verschlimmerung .....	118
6. Bestimmung des Grades der Schädigungsfolgen .....	119
7. Folgeschaden .....	120
8. Folgen von medizinischen Maßnahmen .....	120
9. Absichtlich herbeigeführte Gesundheitsstörungen .....	121
10. Ursächlicher Zusammenhang zwischen Schädigung und Tod .....	121
11. (gestrichen) .....	121
12. (gestrichen) .....	121
13. Voraussetzungen für die Pflegezulage, Pflegezulagestufen .....	122

## Teil D

### Merkzeichen

---

1. Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr (Merkzeichen G) .....	127
2. Berechtigung für eine ständige Begleitung (Merkzeichen B) .....	129
3. (aufgehoben) .....	129
4. Gehörlosigkeit (Merkzeichen Gl) .....	129

**Teil A**  
**Gemeinsame Grundsätze**



## Vorbemerkung:

Wenn mit dem Grad der Behinderung und dem Grad der Schädigungsfolgen das Maß für die Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gemeint ist, wird einheitlich die Abkürzung GdS benutzt.

### 1. Schädigungsfolgen

1

- a) Als Schädigungsfolge wird im sozialen Entschädigungsrecht jede Gesundheitsstörung bezeichnet, die in ursächlichem Zusammenhang mit einer Schädigung steht, die nach dem entsprechenden Gesetz zu berücksichtigen ist.
- b) Die Auswirkungen der Schädigungsfolge werden mit dem Grad der Schädigungsfolgen (GdS) bemessen.
- c) Zu den Schädigungsfolgen gehören auch Abweichungen vom Gesundheitszustand, die keinen GdS bedingen (z.B. funktionell bedeutungslose Narben, Verlust von Zähnen).

### 2. Grad der Schädigungsfolgen (GdS), Grad der Behinderung (GdB)

2

- a) GdS und GdB werden nach gleichen Grundsätzen bemessen. Beide Begriffe unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der GdS nur auf die Schädigungsfolgen (also kausal) und der GdB auf alle Gesundheitsstörungen unabhängig von ihrer Ursache (also final) bezogen ist. Beide Begriffe haben die Auswirkungen von Funktionsbeeinträchtigungen in allen Lebensbereichen und nicht nur die Einschränkungen im allgemeinen Erwerbsleben zum Inhalt. GdS und GdB sind ein Maß für die körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Auswirkungen einer Funktionsbeeinträchtigung aufgrund eines Gesundheitsschadens.
- b) Aus dem GdB und aus dem GdS ist nicht auf das Ausmaß der Leistungsfähigkeit zu schließen. GdB und GdS sind grundsätzlich unabhängig vom ausgeübten oder angestrebten Beruf zu beurteilen, es sei denn, dass bei Begutachtungen im sozialen Entschädigungsrecht ein besonderes berufliches Betroffensein berücksichtigt werden muss.
- c) GdB und GdS setzen stets eine Regelwidrigkeit gegenüber dem für das Lebensalter typischen Zustand voraus. Dies ist insbesondere bei Kindern und alten Menschen zu beachten. Physiologische Veränderungen im Alter sind bei der Beurteilung des GdB und GdS nicht zu berücksichtigen. Als solche Veränderungen sind die körperlichen und psychischen Leistungseinschränkungen anzusehen, die sich im Alter regelhaft entwickeln, d. h. für das Alter nach ihrer Art und ihrem Umfang typisch sind. Demgegenüber sind pathologische Veränderungen, d. h.

Gesundheitsstörungen, die nicht regelmäßig und nicht nur im Alter beobachtet werden können, bei der Beurteilung des GdB und GdS zu berücksichtigen, auch dann, wenn sie erstmalig im höheren Alter auftreten oder als „Alterskrankheiten“ (z.B. „Altersdiabetes“, „Altersstar“) bezeichnet werden.

- d) Die in der GdS-Tabelle aufgeführten Werte sind aus langer Erfahrung gewonnen und stellen altersunabhängige (auch trainingsunabhängige) Mittelwerte dar. Je nach Einzelfall kann von den Tabellenwerten mit einer die besonderen Gegebenheiten darstellenden Begründung abgewichen werden.
- e) Da der GdS seiner Natur nach nur annähernd bestimmt werden kann, sind beim GdS nur Zehnerwerte anzugeben. Dabei sollen im Allgemeinen die folgenden Funktionssysteme zusammenfassend beurteilt werden: Gehirn einschließlich Psyche; Augen; Ohren; Atmung; Herz- Kreislauf; Verdauung; Harnorgane; Geschlechtsapparat; Haut; Blut einschließlich blutbildendes Gewebe und Immunsystem; innere Sekretion und Stoffwechsel; Arme; Beine; Rumpf. Die sehr wenigen in der GdS-Tabelle noch enthaltenen Fünfergrade sind alle auf ganz eng umschriebene Gesundheitsstörungen bezogen, die selten allein und sehr selten genau in dieser Form und Ausprägung vorliegen.
- f) Der GdS setzt eine nicht nur vorübergehende und damit eine über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten sich erstreckende Gesundheitsstörung voraus. Dementsprechend ist bei abklingenden Gesundheitsstörungen der Wert festzusetzen, der dem über sechs Monate hinaus verbliebenen – oder voraussichtlich verbleibenden – Schaden entspricht. Schwankungen im Gesundheitszustand bei längerem Leidensverlauf ist mit einem Durchschnittswert Rechnung zu tragen. Dies bedeutet: Wenn bei einem Leiden der Verlauf durch sich wiederholende Besserungen und Verschlechterungen des Gesundheitszustandes geprägt ist (Beispiele: chronische Bronchitis, Hautkrankheiten, Anfallsleiden), können die zeitweiligen Verschlechterungen – aufgrund der anhaltenden Auswirkungen auf die gesamte Lebensführung – nicht als vorübergehende Gesundheitsstörungen betrachtet werden. Dementsprechend muss in solchen Fällen bei der GdB- und GdS-Beurteilung von dem „durchschnittlichen“ Ausmaß der Beeinträchtigung ausgegangen werden.
- g) Stirbt ein Antragsteller oder eine Antragstellerin innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt einer Gesundheitsstörung, so ist für diese Gesundheitsstörung der GdS anzusetzen, der nach ärztlicher Erfahrung nach Ablauf von sechs Monaten nach Eintritt der Gesundheitsstörung zu erwarten gewesen wäre. Fallen Eintritt der Gesundheitsstörung und Tod jedoch zusammen, kann ein GdS nicht angenommen werden. Eintritt der Gesundheitsstörung und Tod fallen nicht nur zusammen, wenn beide Ereignisse im selben Augenblick eintreten. Dies ist vielmehr auch dann der Fall, wenn die Gesundheitsstörung in so rascher Entwicklung zum Tode führt, dass der Eintritt der Gesundheitsstörung und des Todes einen untrennbaren Vorgang darstellen.

## Gemeinsame Grundsätze

- h) Gesundheitsstörungen, die erst in der Zukunft zu erwarten sind, sind beim GdS nicht zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit des Abwartens einer Heilungsbewährung stellt eine andere Situation dar; während der Zeit dieser Heilungsbewährung ist ein höherer GdS gerechtfertigt, als er sich aus dem festgestellten Schaden ergibt.
- i) Bei der Beurteilung des GdS sind auch seelische Begleiterscheinungen und Schmerzen zu beachten. Die in der GdS-Tabelle niedergelegten Sätze berücksichtigen bereits die üblichen seelischen Begleiterscheinungen (z.B. bei Entstellung des Gesichts, Verlust der weiblichen Brust). Sind die seelischen Begleiterscheinungen erheblich höher als aufgrund der organischen Veränderungen zu erwarten wäre, so ist ein höherer GdS gerechtfertigt. Vergleichsmaßstab ist nicht der behinderte Mensch, der überhaupt nicht oder kaum unter seinem Körperschaden leidet, sondern die allgemeine ärztliche Erfahrung hinsichtlich der regelhaften Auswirkungen. Außergewöhnliche seelische Begleiterscheinungen sind anzunehmen, wenn anhaltende psychoreaktive Störungen in einer solchen Ausprägung vorliegen, dass eine spezielle ärztliche Behandlung dieser Störungen – z.B. eine Psychotherapie – erforderlich ist.
- j) Ähnliches gilt für die Berücksichtigung von Schmerzen. Die in der GdS-Tabelle angegebenen Werte schließen die üblicherweise vorhandenen Schmerzen mit ein und berücksichtigen auch erfahrungsgemäß besonders schmerzhaft Zustände. Ist nach Ort und Ausmaß der pathologischen Veränderungen eine über das übliche Maß hinausgehende Schmerzhaftigkeit nachgewiesen, die eine ärztliche Behandlung erfordert, können höhere Werte angesetzt werden. Das kommt zum Beispiel bei Kausalgien und bei stark ausgeprägten Stumpfbeschwerden nach Amputationen (Stumpfnervenschmerzen, Phantomschmerzen) in Betracht. Ein Phantomgefühl allein bedingt keinen GdS.

### 3. Gesamt-GdS

3

- a) Liegen mehrere Funktionsbeeinträchtigungen vor, so sind zwar Einzel-GdS anzugeben; bei der Ermittlung des Gesamt-GdS durch alle Funktionsbeeinträchtigungen dürfen jedoch die einzelnen Werte nicht addiert werden. Auch andere Rechenmethoden sind für die Bildung eines Gesamt-GdS ungeeignet. Maßgebend sind die Auswirkungen der einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen zueinander.
- b) Bei der Gesamtwürdigung der verschiedenen Funktionsbeeinträchtigungen sind unter Berücksichtigung aller sozialmedizinischen Erfahrungen Vergleiche mit Gesundheitsschäden anzustellen, zu denen in der Tabelle feste GdS-Werte angegeben sind.

- c) Bei der Beurteilung des Gesamt-GdS ist in der Regel von der Funktionsbeeinträchtigung auszugehen, die den höchsten Einzel-GdS bedingt, und dann im Hinblick auf alle weiteren Funktionsbeeinträchtigungen zu prüfen, ob und inwieweit hierdurch das Ausmaß der Behinderung größer wird, ob also wegen der weiteren Funktionsbeeinträchtigungen dem ersten GdS 10 oder 20 oder mehr Punkte hinzuzufügen sind, um der Behinderung insgesamt gerecht zu werden.
- d) Um die Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen zueinander beurteilen zu können, muss aus der ärztlichen Gesamtschau heraus beachtet werden, dass die Beziehungen der Funktionsbeeinträchtigungen zueinander unterschiedlich sein können:
  - aa) Die Auswirkungen der einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen können voneinander unabhängig sein und damit ganz verschiedene Bereiche im Ablauf des täglichen Lebens betreffen.
  - bb) Eine Funktionsbeeinträchtigung kann sich auf eine andere besonders nachteilig auswirken. Dies ist vor allem der Fall, wenn Funktionsbeeinträchtigungen an paarigen Gliedmaßen oder Organen – also z.B. an beiden Armen oder beiden Beinen oder beiden Nieren oder beiden Augen – vorliegen.
  - cc) Die Auswirkungen von Funktionsbeeinträchtigungen können sich überschneiden.
  - dd) Die Auswirkungen einer Funktionsbeeinträchtigung werden durch eine hinzutretende Gesundheitsstörung nicht verstärkt.
  - ee) Von Ausnahmefällen (z.B. hochgradige Schwerhörigkeit eines Ohres bei schwerer beidseitiger Einschränkung der Sehfähigkeit) abgesehen, führen zusätzliche leichte Gesundheitsstörungen, die nur einen GdS von 10 bedingen, nicht zu einer Zunahme des Ausmaßes der Gesamtbeeinträchtigung, auch nicht, wenn mehrere derartige leichte Gesundheitsstörungen nebeneinander bestehen. Auch bei leichten Funktionsbeeinträchtigungen mit einem GdS von 20 ist es vielfach nicht gerechtfertigt, auf eine wesentliche Zunahme des Ausmaßes der Behinderung zu schließen.



## 4. Hilflosigkeit

4

- a) Für die Gewährung einer Pflegezulage im sozialen Entschädigungsrecht ist Grundvoraussetzung, dass Beschädigte (infolge der Schädigung) „hilflos“ sind.
- b) Hilflos sind diejenigen, die infolge von Gesundheitsstörungen – nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) und dem Einkommensteuergesetz „nicht nur vorübergehend“ – für eine Reihe von häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd bedürfen. Diese Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Hilfe in Form einer Überwachung oder einer Anleitung zu den genannten Verrichtungen erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd geleistet werden muss, jedoch eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung erforderlich ist.
- c) Häufig und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen zur Sicherung der persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages sind insbesondere An- und Auskleiden, Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Verrichten der Notdurft. Außerdem sind notwendige körperliche Bewegung, geistige Anregung und Möglichkeiten zur Kommunikation zu berücksichtigen. Hilflosigkeit liegt im oben genannten Sinne auch dann vor, wenn ein psychisch oder geistig behinderter Mensch zwar bei zahlreichen Verrichtungen des täglichen Lebens der Hilfe nicht unmittelbar bedarf, er diese Verrichtungen aber infolge einer Antriebsschwäche ohne ständige Überwachung nicht vornimmt. Die ständige Bereitschaft ist z.B. anzunehmen, wenn Hilfe häufig und plötzlich wegen akuter Lebensgefahr notwendig ist.
- d) Der Umfang der notwendigen Hilfe bei den häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen muss erheblich sein. Dies ist der Fall, wenn die Hilfe dauernd für zahlreiche Verrichtungen, die häufig und regelmäßig wiederkehren, benötigt wird. Einzelne Verrichtungen, selbst wenn sie lebensnotwendig sind und im täglichen Lebensablauf wiederholt vorgenommen werden, genügen nicht (z.B. Hilfe beim Anziehen einzelner Bekleidungsstücke, notwendige Begleitung bei Reisen und Spaziergängen, Hilfe im Straßenverkehr, einfache Wund- oder Heilbehandlung, Hilfe bei Heimdialyse ohne Notwendigkeit weiterer Hilfeleistung). Verrichtungen, die mit der Pflege der Person nicht unmittelbar zusammenhängen (z.B. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung) müssen außer Betracht bleiben.
- e) Bei einer Reihe schwerer Behinderungen, die aufgrund ihrer Art und besonderen Auswirkungen regelhaft Hilfeleistungen in erheblichem Umfang erfordern, kann im Allgemeinen ohne nähere Prüfung angenommen werden, dass die Voraussetzungen für das Vorliegen von Hilflosigkeit erfüllt sind. Dies gilt stets
- aa) bei Blindheit und hochgradiger Sehbehinderung,

- bb) Querschnittslähmung und anderen Behinderungen, die auf Dauer und ständig – auch innerhalb des Wohnraums – die Benutzung eines Rollstuhls erfordern,
- f) in der Regel auch
  - aa) bei Hirnschäden, Anfallsleiden, geistiger Behinderung und Psychosen, wenn diese Behinderungen allein einen GdS von 100 bedingen,
  - bb) Verlust von zwei oder mehr Gliedmaßen, ausgenommen Unterschenkel oder Fußamputation beiderseits. (Als Verlust einer Gliedmaße gilt der Verlust mindestens der ganzen Hand oder des ganzen Fußes).
- g) Führt eine Behinderung zu dauerndem Krankenlager, so sind stets auch die Voraussetzungen für die Annahme von Hilflosigkeit erfüllt. Dauerndes Krankenlager setzt nicht voraus, dass der behinderte Mensch das Bett überhaupt nicht verlassen kann.
- h) Stirbt ein behinderter Mensch innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt einer Gesundheitsstörung, so ist die Frage der Hilflosigkeit analog Nummer 2 Buchstabe g zu beurteilen.

## 5. Besonderheiten der Beurteilung der Hilflosigkeit bei Kindern und Jugendlichen

### 5

- a) Bei der Beurteilung der Hilflosigkeit bei Kindern und Jugendlichen sind nicht nur die bei der Hilflosigkeit genannten „Verrichtungen“ zu beachten. Auch die Anleitung zu diesen „Verrichtungen“, die Förderung der körperlichen und geistigen Entwicklung (z.B. durch Anleitung im Gebrauch der Gliedmaßen oder durch Hilfen zum Erfassen der Umwelt und zum Erlernen der Sprache) sowie die notwendige Überwachung gehören zu den Hilfeleistungen, die für die Frage der Hilflosigkeit von Bedeutung sind.
- b) Stets ist nur der Teil der Hilfsbedürftigkeit zu berücksichtigen, der wegen der Behinderung den Umfang der Hilfsbedürftigkeit eines gesunden gleichaltrigen Kindes überschreitet. Der Umfang der wegen der Behinderungen notwendigen zusätzlichen Hilfeleistungen muss erheblich sein. Bereits im ersten Lebensjahr können infolge der Behinderung Hilfeleistungen in solchem Umfang erforderlich sein, dass dadurch die Voraussetzungen für die Annahme von Hilflosigkeit erfüllt sind.
- c) Die Besonderheiten des Kindesalters führen dazu, dass zwischen dem Ausmaß der Behinderung und dem Umfang der wegen der Behinderung erforderlichen Hilfeleistungen nicht immer eine Korrelation besteht, so dass – anders als bei Erwachsenen – auch schon bei niedrigerem GdS Hilflosigkeit vorliegen kann.

## Gemeinsame Grundsätze

- d) Bei angeborenen oder im Kindesalter aufgetretenen Behinderungen ist im Einzelnen folgendes zu beachten:
- aa) Bei geistiger Behinderung kommt häufig auch bei einem GdS unter 100 – und dann in der Regel bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres – Hilflosigkeit in Betracht, insbesondere wenn das Kind wegen gestörten Verhaltens ständiger Überwachung bedarf. Hilflosigkeit kann auch schon im Säuglingsalter angenommen werden, z.B. durch Nachweis eines schweren Hirnschadens.
  - bb) Bei tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, die für sich allein einen GdS von mindestens 50 bedingen, und bei anderen gleich schweren, im Kindesalter beginnenden Verhaltens- und emotionalen Störungen mit lang andauernden erheblichen Einordnungsschwierigkeiten ist regelhaft Hilflosigkeit bis zum 18. Lebensjahr anzunehmen.
  - cc) Bei hirnorganischen Anfallsleiden ist häufiger als bei Erwachsenen auch bei einem GdS unter 100 unter Berücksichtigung der Anfallsart, Anfallsfrequenz und eventueller Verhaltensauffälligkeiten die Annahme von Hilflosigkeit gerechtfertigt.
  - dd) Bei sehbehinderten Kindern und Jugendlichen mit Einschränkungen des Sehvermögens, die für sich allein einen GdS von wenigstens 80 bedingen, ist bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Hilflosigkeit anzunehmen.
  - ee) Bei Taubheit und an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit ist Hilflosigkeit ab Beginn der Frühförderung und dann – insbesondere wegen des in dieser Zeit erhöhten Kommunikationsbedarfs – in der Regel bis zur Beendigung der Ausbildung anzunehmen. Zur Ausbildung zählen in diesem Zusammenhang: der Schul-, Fachschul- und Hochschulbesuch, eine berufliche Erstausbildung und Weiterbildung sowie vergleichbare Maßnahmen der beruflichen Bildung.
  - ff) Bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalte und kompletter Gaumensegelspalte ist bis zum Abschluss der Erstbehandlung (in der Regel ein Jahr nach der Operation) Hilflosigkeit anzunehmen. Die Kinder benötigen während dieser Zeit in hohem Maße Hilfeleistungen, die weit über diejenigen eines gesunden gleichaltrigen Kindes hinausgehen, vor allem bei der Nahrungsaufnahme (gestörte Atmung, Gefahr des Verschluckens), bei der Reinigung der Mundhöhle und des Nasen-Rachenraumes, beim Spracherwerb sowie bei der Überwachung beim Spielen.
  - gg) Beim Bronchialasthma schweren Grades ist Hilflosigkeit in der Regel bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres anzunehmen.

- hh) Bei angeborenen oder in der Kindheit erworbenen Herzschäden ist bei einer schweren Leistungsbeeinträchtigung entsprechend den in Teil B Nummer 9.1.1 angegebenen Gruppen 3 und 4 Hilflosigkeit anzunehmen, und zwar bis zu einer Besserung der Leistungsfähigkeit (z.B. durch Operation), längstens bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres.
- ii) Bei Behandlung mit künstlicher Niere ist Hilflosigkeit bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres anzunehmen. Bei einer Niereninsuffizienz, die für sich allein einen GdS von 100 bedingt, sind Hilfeleistungen in ähnlichem Umfang erforderlich, sodass auch hier bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres die Annahme von Hilflosigkeit begründet ist.
- jj) Beim Diabetes mellitus ist Hilflosigkeit bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres anzunehmen.
- kk) Bei Phenylketonurie ist Hilflosigkeit ab Diagnosestellung – in der Regel bis zum 14. Lebensjahr – anzunehmen. Über das 14. Lebensjahr hinaus kommt Hilflosigkeit in der Regel nur noch dann in Betracht, wenn gleichzeitig eine relevante Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung vorliegt.
- ll) Bei der Mukoviszidose ist bei der Notwendigkeit umfangreicher Betreuungsmaßnahmen – im Allgemeinen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres – Hilflosigkeit anzunehmen. Das ist immer der Fall bei Mukoviszidose, die für sich allein einen GdS von wenigstens 50 bedingt (siehe Teil B Nummer 15.5). Nach Vollendung des 16. Lebensjahres kommt Hilflosigkeit bei schweren und schwersten Einschränkungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres in Betracht.
- mm) Bei malignen Erkrankungen (z.B. akute Leukämie) ist Hilflosigkeit für die Dauer der zytostatischen Intensiv-Therapie anzunehmen.
- nn) Bei angeborenen, erworbenen oder therapieinduzierten schweren Immundefekten ist Hilflosigkeit für die Dauer des Immundefektes, der eine ständige Überwachung wegen der Infektionsgefahr erforderlich macht, anzunehmen.
- oo) Bei der Hämophilie ist bei Notwendigkeit der Substitutionsbehandlung – und damit schon bei einer Restaktivität von antihämphilem Globulin von 5 % und darunter – stets bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres, darüber hinaus häufig je nach Blutungsneigung (zwei oder mehr ausgeprägte Gelenkblutungen pro Jahr) und Reifegrad auch noch weitere Jahre, Hilflosigkeit anzunehmen.
- pp) Bei der juvenilen chronischen Polyarthritis ist Hilflosigkeit anzunehmen, solange die Gelenksituation eine ständige Überwachung oder andauernd Hilfestellungen beim Gebrauch der betroffenen Gliedmaßen sowie Anlei-

- tungen zu Bewegungsübungen erfordert, in der Regel bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. Bei der systemischen Verlaufsform (Still-Syndrom) und anderen systemischen Bindegewebskrankheiten (z.B. Lupus erythematodes, Sharp-Syndrom, Dermatomyositis) ist für die Dauer des aktiven Stadiums Hilflosigkeit anzunehmen.
- qq) Bei der Osteogenesis imperfecta ist die Hilflosigkeit nicht nur von den Funktionseinschränkungen der Gliedmaßen, sondern auch von der Häufigkeit der Knochenbrüche abhängig. In der Regel bedingen zwei oder mehr Knochenbrüche pro Jahr Hilflosigkeit. Hilflosigkeit aufgrund einer solchen Bruchneigung ist solange anzunehmen, bis ein Zeitraum von zwei Jahren ohne Auftreten von Knochenbrüchen abgelaufen ist, längstens jedoch bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres.
- rr) Bei klinisch gesicherter Typ-I-Allergie gegen schwer vermeidbare Allergene (z.B. bestimmte Nahrungsmittel), bei der aus dem bisherigen Verlauf auf die Gefahr lebensbedrohlicher anaphylaktischer Schocks zu schließen ist, ist Hilflosigkeit – in der Regel bis zum Ende des 12. Lebensjahres – anzunehmen.
- ss) Bei der Zöliakie kommt Hilflosigkeit nur ausnahmsweise in Betracht. Der Umfang der notwendigen Hilfeleistungen bei der Zöliakie ist regelmäßig wesentlich geringer als etwa bei Kindern mit Phenylketonurie oder mit Diabetes mellitus.
- e) Wenn bei Kindern und Jugendlichen Hilflosigkeit festgestellt worden ist, muss bei der Beurteilung der Frage einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse Folgendes beachtet werden: Die Voraussetzungen für die Annahme von Hilflosigkeit können nicht nur infolge einer Besserung der Gesundheitsstörungen entfallen, sondern auch dadurch, dass behinderte Jugendliche infolge des Reifungsprozesses – etwa nach Abschluss der Pubertät – ausreichend gelernt haben, die wegen der Behinderung erforderlichen Maßnahmen selbstständig und eigenverantwortlich durchzuführen, die vorher von Hilfspersonen geleistet oder überwacht werden mussten.

## 6 6. Blindheit und hochgradige Sehbehinderung

---

- a) Blind ist ein behinderter Mensch, dem das Augenlicht vollständig fehlt. Als blind ist auch ein behinderter Mensch anzusehen, dessen Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht beidäugig mehr als 0,02 (1/50) beträgt oder wenn andere Störungen des Sehvermögens von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie dieser Beeinträchtigung der Sehschärfe gleichzustellen sind.
- b) Eine der Herabsetzung der Sehschärfe auf 0,02 (1/50) oder weniger gleichzusetzende Sehbehinderung liegt nach den Richtlinien der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft bei folgenden Fallgruppen vor:
  - aa) bei einer Einengung des Gesichtsfeldes, wenn bei einer Sehschärfe von 0,033 (1/30) oder weniger die Grenze des Restgesichtsfeldes in keiner Richtung mehr als 30° vom Zentrum entfernt ist, wobei Gesichtsfeldreste jenseits von 50° unberücksichtigt bleiben,
  - bb) bei einer Einengung des Gesichtsfeldes, wenn bei einer Sehschärfe von 0,05 (1/20) oder weniger die Grenze des Restgesichtsfeldes in keiner Richtung mehr als 15° vom Zentrum entfernt ist, wobei Gesichtsfeldreste jenseits von 50° unberücksichtigt bleiben,
  - cc) bei einer Einengung des Gesichtsfeldes, wenn bei einer Sehschärfe von 0,1 (1/10) oder weniger die Grenze des Restgesichtsfeldes in keiner Richtung mehr als 7,5° vom Zentrum entfernt ist, wobei Gesichtsfeldreste jenseits von 50° unberücksichtigt bleiben,
  - dd) bei einer Einengung des Gesichtsfeldes, auch bei normaler Sehschärfe, wenn die Grenze der Gesichtsfeldinsel in keiner Richtung mehr als 5° vom Zentrum entfernt ist, wobei Gesichtsfeldreste jenseits von 50° unberücksichtigt bleiben,
  - ee) bei großen Skotomen im zentralen Gesichtsfeldbereich, wenn die Sehschärfe nicht mehr als 0,1 (1/10) beträgt und im 50°-Gesichtsfeld unterhalb des horizontalen Meridians mehr als die Hälfte ausgefallen ist,
  - ff) bei homonymen Hemianopsien, wenn die Sehschärfe nicht mehr als 0,1 (1/10) beträgt und das erhaltene Gesichtsfeld in der Horizontalen nicht mehr als 30° Durchmesser besitzt,
  - gg) bei bitemporalen oder binasalen Hemianopsien, wenn die Sehschärfe nicht mehr als 0,1 (1/10) beträgt und kein Binokularsehen besteht.
- c) Blind ist auch ein behinderter Mensch mit einem nachgewiesenen vollständigen Ausfall der Sehrinde (Rindenblindheit), nicht aber mit einer visuellen Agnosie oder anderen gnostischen Störungen.

- d) Für die Feststellung von Hilflosigkeit ist im Übrigen zu prüfen, ob eine hochgradige Sehbehinderung vorliegt. Hochgradig in seiner Sehfähigkeit behindert ist ein Mensch, dessen Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht beidäugig mehr als 0,05 (1/20) beträgt oder wenn andere hinsichtlich des Schweregrades gleichzusetzende Störungen der Sehfunktion vorliegen. Dies ist der Fall, wenn die Einschränkung des Sehvermögens einen GdS von 100 bedingt und noch keine Blindheit vorliegt.

## 7. Wesentliche Änderung der Verhältnisse

---

7

- a) Eine wesentliche Änderung im Ausmaß der Schädigungsfolgen oder der Behinderung liegt nur vor, wenn der veränderte Gesundheitszustand mehr als sechs Monate angehalten hat oder voraussichtlich anhalten wird und die Änderung des GdS wenigstens 10 beträgt. Eine wesentliche Änderung ist auch gegeben, wenn die entscheidenden Voraussetzungen für weitere Leistungen im sozialen Entschädigungsrecht (z.B. Pflegezulage) oder für Nachteilsausgleiche für behinderte Menschen erfüllt werden oder entfallen sind.
- b) Nach Ablauf der Heilungsbewährung ist auch bei gleichbleibenden Symptomen eine Neubewertung des GdS zulässig, weil der Ablauf der Heilungsbewährung eine wesentliche Änderung der Verhältnisse darstellt.
- c) Bei Beurteilungen im sozialen Entschädigungsrecht ist bei einer Zunahme des Leidensumfangs zusätzlich zu prüfen, ob die Weiterentwicklung noch Folge einer Schädigung ist. Auch bei gleichbleibendem Erscheinungsbild kann eine wesentliche Änderung der gesundheitlichen Verhältnisse vorliegen, wenn sich die schädigungsbedingte Störung, die dem Erscheinungsbild zunächst zugrunde lag, gebessert oder ganz zurückgebildet hat, das Leidensbild jedoch aufgrund neuer Ursachen bestehen geblieben ist („Verschiebung der Wesensgrundlage“).





**Teil B**  
**GdS-Tabelle**



## 1. Allgemeine Hinweise zur GdS-Tabelle

1

- a) Die nachstehend genannten GdS sind Anhaltswerte. Es ist unerlässlich, alle die Teilhabe beeinträchtigenden körperlichen, geistigen und seelischen Störungen im Einzelfall zu berücksichtigen. Die Beurteilungsspannen tragen den Besonderheiten des Einzelfalles Rechnung.
- b) Bei Gesundheitsstörungen, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, ist der GdS in Analogie zu vergleichbaren Gesundheitsstörungen zu beurteilen.
- c) Eine Heilungsbewährung ist abzuwarten nach Transplantationen innerer Organe und nach der Behandlung von Krankheiten, bei denen dies in der Tabelle vorgegeben ist. Dazu gehören vor allen bösartige Geschwulstkrankheiten. Für die häufigsten und wichtigsten solcher Krankheiten sind im Folgenden Anhaltswerte für den GdS angegeben. Sie sind auf den Zustand nach operativer oder anderweitiger Beseitigung der Geschwulst bezogen. Der Zeitraum des Abwartens einer Heilungsbewährung beträgt in der Regel fünf Jahre; kürzere Zeiträume werden in der Tabelle vermerkt. Maßgeblicher Bezugspunkt für den Beginn der Heilungsbewährung ist der Zeitpunkt, an dem die Geschwulst durch Operation oder andere Primärtherapie als beseitigt angesehen werden kann; eine zusätzliche adjuvante Therapie hat keinen Einfluss auf den Beginn der Heilungsbewährung. Der aufgeführte GdS bezieht den regelhaft verbleibenden Organ- oder Gliedmaßenschaden ein. Außergewöhnliche Folgen oder Begleiterscheinungen der Behandlung – z.B. lang dauernde schwere Auswirkungen einer wiederholten Chemotherapie – sind zu berücksichtigen. Bei den im Folgenden nicht genannten malignen Geschwulstkrankheiten ist von folgenden Grundsätzen auszugehen: Bis zum Ablauf der Heilungsbewährung – in der Regel bis zum Ablauf des fünften Jahres nach der Geschwulstbeseitigung – ist in den Fällen, in denen der verbliebene Organ- oder Gliedmaßenschaden für sich allein keinen GdS von wenigstens 50 bedingt, im Allgemeinen nach Geschwulstbeseitigung im Frühstadium ein GdS von 50 und nach Geschwulstbeseitigung in höheren Stadien ein GdS von 80 angemessen. Bedingen der verbliebene Körperschaden oder die Therapiefolgen einen GdS von 50 oder mehr, ist der bis zum Ablauf der Heilungsbewährung anzusetzende GdS entsprechend höher zu bewerten.
- d) Ein Carcinoma in situ (Cis) rechtfertigt grundsätzlich kein Abwarten einer Heilungsbewährung. Ausgenommen hiervon sind das Carcinoma in situ der Harnblase und das Carcinoma in situ der Brustdrüse (intraduktales und lobuläres Carcinoma in situ), bei denen wegen klinischer Besonderheiten bei Vorliegen o.g. Voraussetzungen das Abwarten einer Heilungsbewährung begründet ist.

## 2 2. Kopf und Gesicht

<b>2.1 Narben nach Warzenfortsatzaufmeißelung</b> .....	<b>0</b>
Einfache Schädelbrüche ohne Komplikationen im Heilverlauf .....	0
Kleinere Knochenlücken, Substanzverluste (auch größere gedeckte) am knöchernen Schädel .....	0 – 10
Schädelnarben am Hirnschädel mit erheblichem Verlust von Knochenmasse ohne Funktionsstörung des Gehirns (einschließlich entstellender Wirkung) .....	30
Hierzu gehören insbesondere alle traumatisch entstandenen erheblichen (nicht gedeckten) Substanzverluste am Hirnschädel, die auch das innere Knochenblatt betreffen.	
Einfache Gesichtsentstellung	
nur wenig störend .....	10
sonst .....	20 – 30
Hochgradige Entstellung des Gesichts .....	50
<b>2.2 Sensibilitätsstörungen im Gesichtsbereich</b>	
leicht .....	0 – 10
ausgeprägt, den oralen Bereich einschließend .....	20 – 30
Gesichtsneuralgien (z.B. Trigeminusneuralgie)	
leicht (seltene, leichte Schmerzen) .....	0 – 10
mittelgradig (häufigere, leichte bis mittelgradige Schmerzen, schon durch geringe Reize auslösbar) .....	20 – 40
schwer (häufige, mehrmals im Monat auftretende starke Schmerzen bzw. Schmerzattacken) .....	50 – 60
besonders schwer (starker Dauerschmerz oder Schmerzattacken mehrmals wöchentlich) .....	70 – 80

### 2.3 Echte Migräne

je nach Häufigkeit und Dauer der Anfälle und Ausprägung der Begleiterscheinungen.

leichte Verlaufsform (Anfälle durchschnittlich einmal monatlich) .....	0 – 10
mittelgradige Verlaufsform (häufigere Anfälle, jeweils einen oder mehrere Tage anhaltend) .....	20 – 40
schwere Verlaufsform (lang andauernde Anfälle mit stark ausgeprägten Begleit- erscheinungen, Anfallspausen von nur wenigen Tagen) .....	50 – 60

### 2.4 Periphere Fazialisparese

einseitig

kosmetisch nur wenig störende Restparese .....	0 – 10
ausgeprägtere Restparese oder Kontrakturen .....	20 – 30
komplette Lähmung oder ausgeprägte Kontraktur .....	40

beidseitig komplette Lähmung .....

## 3. Nervensystem und Psyche

3

### 3.1 Hirnschäden

- Ein Hirnschaden ist nachgewiesen, wenn Symptome einer organischen Veränderung des Gehirns – nach Verletzung oder Krankheit nach dem Abklingen der akuten Phase – festgestellt worden sind. Wenn bei späteren Untersuchungen keine hirnorganischen Funktionsstörungen und Leistungsbeeinträchtigungen mehr zu erkennen sind beträgt der GdS dann – auch unter Einschluss geringer z.B. vegetativer Beschwerden – 20; nach offenen Hirnverletzungen nicht unter 30.
- Bestimmend für die Beurteilung des GdS ist das Ausmaß der bleibenden Ausfallserscheinungen. Dabei sind der neurologische Befund, die Ausfallserscheinungen im psychischen Bereich unter Würdigung der prämorbidem Persönlichkeit und ggf. das Auftreten von zerebralen Anfällen zu beachten. Bei der Mannigfaltigkeit der Folgezustände von Hirnschädigungen kommt ein GdS zwischen 20 und 100 in Betracht.
- Bei Kindern ist zu berücksichtigen, dass sich die Auswirkungen eines Hirnschadens abhängig vom Reifungsprozess sehr verschieden (Besserung oder Verschlechterung) entwickeln können, so dass in der Regel Nachprüfungen in Abständen von wenigen Jahren angezeigt sind.

- d) Bei einem mit Ventil versorgten Hydrozephalus ist ein GdS von wenigstens 30 anzusetzen.
- e) Nicht nur vorübergehende vegetative Störungen nach Gehirnerschütterung (reversible und morphologisch nicht nachweisbare Funktionsstörung des Gesamthirns) rechtfertigen im ersten Jahr nach dem Unfall einen GdS von 10 bis 20.

Bei der folgenden GdS-Tabelle der Hirnschäden soll die unter Nummer 3.1.1 genannte Gesamtbewertung im Vordergrund stehen. Die unter Nummer 3.1.2 angeführten isoliert vorkommenden bzw. führenden Syndrome stellen eine ergänzende Hilfe zur Beurteilung dar.

### 3.1.1 Grundsätze der Gesamtbewertung von Hirnschäden

Hirnschäden mit geringer Leistungsbeeinträchtigung .....	30 – 40
Hirnschäden mit mittelschwerer Leistungsbeeinträchtigung .....	50 – 60
Hirnschäden mit schwerer Leistungsbeeinträchtigung .....	70 – 100

### 3.1.2 Bewertung von Hirnschäden mit isoliert vorkommenden bzw. führenden Syndromen

(bei Begutachtungen im sozialen Entschädigungsrecht auch zur Feststellung der Schwerstbeschädigtenzulage)

Hirnschäden mit psychischen Störungen

leicht (im Alltag sich gering auswirkend) .....	30 – 40
mittelgradig (im Alltag sich deutlich auswirkend) .....	50 – 60
schwer .....	70 – 100

Zentrale vegetative Störungen als Ausdruck eines Hirndauerschadens (z.B. Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus, der Vasomotorenregulation oder der Schweißregulation)

leicht .....	30
mittelgradig, auch mit vereinzelt synkopalen Anfällen .....	40
mit häufigeren Anfällen oder erheblichen Auswirkungen auf den Allgemeinzustand .....	50

Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen (spino-) zerebellarer Ursache je nach dem Ausmaß der Störung der Ziel- und Feinmotorik einschließlich der Schwierigkeiten beim Gehen und Stehen (siehe hierzu auch bei Hör- und Gleichgewichtsorgan) .....

30 – 100

## GdS-Tabelle

Hirnschäden mit kognitiven Leistungsstörungen (z. B. Aphasie, Apraxie, Agnosie)

leicht (z.B. Restaphasie).....	30 – 40
mittelgradig (z.B. Aphasie mit deutlicher bis sehr ausgeprägter Kommunikationsstörung).....	50 – 80
schwer (z.B. globale Aphasie).....	90 – 100

Zerebral bedingte Teillähmungen und Lähmungen

leichte Restlähmungen und Tonusstörungen der Gliedmaßen.....	30
bei ausgeprägteren Teillähmungen und vollständigen Lähmungen ist der GdS aus Vergleichen mit dem GdS bei Gliedmaßenverlusten, peripheren Lähmungen und anderen Funktionseinbußen der Gliedmaßen abzuleiten	
vollständige Lähmung von Arm und Bein (Hemiplegie) .....	100

Parkinson-Syndrom

ein- oder beidseitig, geringe Störung der Bewegungsabläufe, keine Gleichgewichtsstörung, geringe Verlangsamung.....	30 – 40
deutliche Störung der Bewegungsabläufe, Gleichgewichtsstörungen, Unsicherheit beim Umdrehen, stärkere Verlangsamung .....	50 – 70
schwere Störung der Bewegungsabläufe bis zur Immobilität.....	80 – 100

Andere extrapyramidale Syndrome – auch mit Hyperkinesen – sind analog nach Art und Umfang der gestörten Bewegungsabläufe und der Möglichkeit ihrer Unterdrückung zu bewerten; bei lokalisierten Störungen (z.B. Torticollis spasmodicus) sind niedrigere GdS als bei generalisierten (z.B. choreatische Syndrome) in Betracht zu ziehen.

Epileptische Anfälle

je nach Art, Schwere, Häufigkeit und tageszeitlicher Verteilung

sehr selten (generalisierte [große] und komplex-fokale Anfälle mit Pausen von mehr als einem Jahr; kleine und einfach-fokale Anfälle mit Pausen von Monaten) .....	40
selten (generalisierte [große] und komplex-fokale Anfälle mit Pausen von Monaten; kleine und einfach-fokale Anfälle mit Pausen von Wochen) .....	50 – 60

mittlere Häufigkeit (generalisierte [große] und komplex-fokale Anfälle mit Pausen von Wochen; kleine und einfach-fokale Anfälle mit Pausen von Tagen) . . . .	60 – 80
häufig (generalisierte [große] oder komplex-fokale Anfälle wöchentlich oder Serien von generalisierten Krampfanfällen, von fokal betonten oder von multifokalen Anfällen; kleine und einfach- fokale Anfälle täglich) . . . . .	90 – 100
nach drei Jahren Anfallsfreiheit bei weiterer Notwendigkeit antikonvulsiver Behandlung . . . . .	30

Ein Anfallsleiden gilt als abgeklungen, wenn ohne Medikation drei Jahre Anfallsfreiheit besteht. Ohne nachgewiesenen Hirnschaden ist dann kein GdS mehr anzunehmen.

**3.2 Narkolepsie**

Je nach Häufigkeit, Ausprägung und Kombination der Symptome (Tagesschläfrigkeit, Schlafattacken, Kataplexien, automatisches Verhalten im Rahmen von Ermüdungserscheinungen, Schlaf lähmungen – häufig verbunden mit hypnagogen Halluzinationen) ist im Allgemeinen ein GdS von 50 bis 80 anzusetzen.

**3.3 Hirntumoren**

Der GdS von Hirntumoren ist vor allem von der Art und Dignität und von der Ausdehnung und Lokalisation mit ihren Auswirkungen abhängig.

Nach der Entfernung gutartiger Tumoren (z.B. Meningeom, Neurinom) richtet sich der GdS allein nach dem verbliebenen Schaden.

Bei Tumoren wie Oligodendrogliom, Ependyom, Astrozytom II, ist der GdS, wenn eine vollständige Tumorentfernung nicht gesichert ist, nicht niedriger als 50 anzusetzen.

Bei malignen Tumoren (z.B. Astrozytom III, Glioblastom, Medulloblastom) ist der GdS mit wenigstens 80 zu bewerten.

Das Abwarten einer Heilungsbewährung (von fünf Jahren) kommt in der Regel nur nach der Entfernung eines malignen Kleinhirntumors des Kindesalters (z.B. Medulloblastom) in Betracht. Der GdS beträgt während dieser Zeit (im Frühstadium) bei geringer Leistungsbeeinträchtigung 50.



**3.4 Beeinträchtigungen der geistigen Leistungsfähigkeit im Kindes- und Jugendalter**

Die GdS-Beurteilung der Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung darf nicht allein vom Ausmaß der Intelligenzminderung und von diesbezüglichen Testergebnissen ausgehen, die immer nur Teile der Behinderung zu einem bestimmten Zeitpunkt erfassen können. Daneben muss stets auch die Persönlichkeitsentwicklung auf affektivem und emotionalem Gebiet, wie auch im Bereich des Antriebs und der Prägung durch die Umwelt mit allen Auswirkungen auf die sozialen Einordnungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

**3.4.1 Entwicklungsstörungen im Kleinkindesalter**

Die Beurteilung setzt eine standardisierte Befunderhebung mit Durchführung geeigneter Testverfahren voraus (Nachuntersuchung mit Beginn der Schulpflicht).

Umschriebene Entwicklungsstörungen in den Bereichen Motorik, Sprache oder Wahrnehmung und Aufmerksamkeit

leicht, ohne wesentliche Beeinträchtigung der Gesamtentwicklung .....	0 – 10
sonst – bis zum Ausgleich – je nach Beeinträchtigung der Gesamtentwicklung .....	20 – 40
bei besonders schwerer Ausprägung .....	50

Globale Entwicklungsstörungen (Einschränkungen in den Bereichen Sprache und Kommunikation, Wahrnehmung und Spielverhalten, Motorik, Selbständigkeit, soziale Integration) je nach Ausmaß der sozialen Einordnungsstörung und der Verhaltensstörung (z.B. Hyperaktivität, Aggressivität)

geringe Auswirkungen .....	30 – 40
starke Auswirkungen (z.B. Entwicklungsquotient [EQ] von 70 bis über 50) .....	50 – 70
schwere Auswirkungen (z.B. EQ 50 und weniger) .....	80 – 100

**3.4.2 Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeit im Schul- und Jugendalter**

Kognitive Teilleistungsschwächen (z.B. Lese-Rechtschreib-Schwäche [Legasthenie], isolierte Rechenstörung)

leicht, ohne wesentliche Beeinträchtigung der Schulleistungen .....	0 – 10
sonst – auch unter Berücksichtigung von Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen – bis zum Ausgleich .....	20 – 40
bei besonders schwerer Ausprägung (selten) .....	50

Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeit mit einem Intelligenzrückstand entsprechend einem Intelligenz-Alter (I.A.) von etwa 10 bis 12 Jahren bei Erwachsenen (Intelligenzquotient [IQ] von etwa 70 bis 60)

wenn während des Schulbesuchs nur geringe Störungen, insbesondere der Auffassung, der Merkfähigkeit, der psychischen Belastbarkeit, der sozialen Einordnung, des Sprechens, der Sprache, oder anderer kognitiver Teilleistungen vorliegen ..... 30 – 40

wenn sich nach Abschluss der Schule noch eine weitere Bildungsfähigkeit gezeigt hat und keine wesentlichen, die soziale Einordnung erschwerenden Persönlichkeitsstörungen bestehen ..... 30 – 40

wenn ein Ausbildungsberuf unter Nutzung der Sonderregelungen für behinderte Menschen erreicht werden kann..... 30 – 40

wenn während des Schulbesuchs die oben genannten Störungen stark ausgeprägt sind oder mit einem Schulversagen zu rechnen ist..... 50 – 70

wenn nach Abschluss der Schule auf eine Beeinträchtigung der Fähigkeit zu selbständiger Lebensführung oder sozialer Einordnung geschlossen werden kann ..... 50 – 70

wenn der behinderte Mensch wegen seiner Behinderung trotz beruflicher Fördermöglichkeiten (z.B. in besonderen Rehabilitationseinrichtungen) nicht in der Lage ist, sich auch unter Nutzung der Sonderregelungen für behinderte Menschen beruflich zu qualifizieren ..... 50 – 70

Intelligenzmangel mit stark eingeeengter Bildungsfähigkeit, erheblichen Mängeln im Spracherwerb, Intelligenzrückstand entsprechend einem I.A. unter 10 Jahren bei Erwachsenen (IQ unter 60)

bei relativ günstiger Persönlichkeitsentwicklung und sozialer Anpassungsmöglichkeit (Teilerfolg in einer Sonderschule, selbständige Lebensführung in einigen Teilbereichen und Einordnung im allgemeinen Erwerbsleben mit einfachen motorischen Fertigkeiten noch möglich) ..... 80 – 90

bei stärkerer Einschränkung der Eingliederungsmöglichkeiten mit hochgradigem Mangel an Selbständigkeit und Bildungsfähigkeit, fehlender Sprachentwicklung, unabhängig von der Arbeitsmarktlage und auf Dauer Beschäftigungsmöglichkeit nur in einer Werkstatt für Behinderte ..... 100

### 3.5 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Die Kriterien der Definitionen der ICD 10-GM Version 2011 müssen erfüllt sein. Komorbide psychische Störungen sind gesondert zu berücksichtigen. Eine Behinderung liegt erst ab Beginn der Teilhabebeeinträchtigung vor. Eine pauschale Festsetzung des GdS nach einem bestimmten Lebensalter ist nicht möglich.

#### 3.5.1 Tief greifende Entwicklungsstörungen (insbesondere frühkindlicher Autismus, atypischer Autismus, Asperger-Syndrom)

Bei tiefgreifenden Entwicklungsstörungen

- ohne soziale Anpassungsschwierigkeiten beträgt der GdS ..... 10–20
- mit leichten sozialen Anpassungsschwierigkeiten beträgt der GdS ..... 30–40
- mit mittleren sozialen Anpassungsschwierigkeiten beträgt der GdS .... 50–70
- mit schweren sozialen Anpassungsschwierigkeiten beträgt der GdS ... 80–100

Soziale Anpassungsschwierigkeiten liegen insbesondere vor, wenn die Integrationsfähigkeit in Lebensbereiche (wie zum Beispiel Regel-Kindergarten, Regel-Schule, allgemeiner Arbeitsmarkt, öffentliches Leben, häusliches Leben) nicht ohne besondere Förderung oder Unterstützung (zum Beispiel durch Eingliederungshilfe) gegeben ist oder wenn die Betroffenen einer über das dem jeweiligen Alter entsprechende Maß hinausgehenden Beaufsichtigung bedürfen. Mittlere soziale Anpassungsschwierigkeiten liegen insbesondere vor, wenn die Integration in Lebensbereiche nicht ohne umfassende Unterstützung (zum Beispiel einen Integrationshelfer als Eingliederungshilfe) möglich ist. Schwere soziale Anpassungsschwierigkeiten liegen insbesondere vor, wenn die Integration in Lebensbereiche auch mit umfassender Unterstützung nicht möglich ist.

#### 3.5.2 Hyperkinetische Störungen und Aufmerksamkeitsstörungen ohne Hyperaktivität

Ohne soziale Anpassungsschwierigkeiten liegt keine Teilhabebeeinträchtigung vor.

Bei sozialen Anpassungsschwierigkeiten

- ohne Auswirkung auf die Integrationsfähigkeit beträgt der GdS ..... 10 – 20
- mit Auswirkungen auf die Integrationsfähigkeit in mehreren Lebensbereichen (wie zum Beispiel Regel- Kindergarten, Regel-Schule, allgemeiner Arbeitsmarkt, öffentliches Leben, häusliches Leben) oder wenn die Betroffenen einer über das dem jeweiligen Alter entsprechende Maß hinausgehenden Beaufsichtigung bedürfen, beträgt der GdS ..... 30 – 40

mit Auswirkungen, die die Integration in Lebensbereiche nicht ohne umfassende Unterstützung oder umfassende Beaufsichtigung ermöglichen, beträgt der GdS .....	50 – 70
mit Auswirkungen, die die Integration in Lebensbereiche auch mit umfassender Unterstützung nicht ermöglichen, beträgt der GdS ....	80 – 100
Ab dem Alter von 25 Jahren beträgt der GdS regelhaft nicht mehr als .....	50

**3.5.3 Störungen des Sozialverhaltens und Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend sind je nach Ausmaß der Teilhabebeeinträchtigung, insbesondere der Einschränkung der sozialen Integrationsfähigkeit und dem Betreuungsaufwand, individuell zu bewerten.**

**3.6 Schizophrene und affektive Psychosen**

Langdauernde (über ein halbes Jahr anhaltende) Psychose im floriden Stadium je nach Einbuße beruflicher und sozialer Anpassungsmöglichkeiten .....	50 – 100
--	----------

Schizophrener Residualzustand (z.B. Konzentrationsstörung, Kontaktschwäche, Vitalitätseinbuße, affektive Nivellierung)

mit geringen und einzelnen Restsymptomen ohne soziale Anpassungsschwierigkeiten .....	10 – 20
mit leichten sozialen Anpassungsschwierigkeiten .....	30 – 40
mit mittelgradigen sozialen Anpassungsschwierigkeiten .....	50 – 70
mit schweren sozialen Anpassungsschwierigkeiten .....	80 – 100

Affektive Psychose mit relativ kurz andauernden, aber häufig wiederkehrenden Phasen

bei 1 bis 2 Phasen im Jahr von mehrwöchiger Dauer je nach Art und Ausprägung .....	30 – 50
bei häufigeren Phasen von mehrwöchiger Dauer .....	60 – 100

Nach dem Abklingen lang dauernder psychotischer Episoden ist eine Heilungsbewährung von zwei Jahren abzuwarten.

GdS während dieser Zeit, wenn bereits mehrere manische oder manische und depressive Phasen vorangegangen sind .....	50
sonst .....	30

Eine Heilungsbewährung braucht nicht abgewartet zu werden, wenn eine monopolar verlaufene depressive Phase vorgelegen hat, die als erste Krankheitsphase oder erst mehr als zehn Jahre nach einer früheren Krankheitsphase aufgetreten ist.

### 3.7 Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Folgen psychischer Traumata

Leichtere psychovegetative oder psychische Störungen ..... 0 – 20

Stärker behindernde Störungen

mit wesentlicher Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit (z.B. ausgeprägtere depressive, hypochondrische, asthenische oder phobische Störungen, Entwicklungen mit Krankheitswert, somatoforme Störungen)..... 30 – 40

Schwere Störungen (z.B. schwere Zwangskrankheit)

mit mittelgradigen sozialen Anpassungsschwierigkeiten..... 50 – 70

mit schweren sozialen Anpassungsschwierigkeiten..... 80 – 100

### 3.8 Psychische Störungen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen

Der schädliche Gebrauch psychotroper Substanzen ohne körperliche oder psychische Schädigung bedingt keinen Grad der Schädigungsfolgen. Die Abhängigkeit von Koffein oder Tabak sowie von Koffein und Tabak bedingt für sich allein in der Regel keine Teilhabebeeinträchtigung.

Abhängigkeit von psychotropen Substanzen liegt vor, wenn als Folge des chronischen Substanzkonsums mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllt sind:

- starker Wunsch (Drang), die Substanz zu konsumieren,
- verminderte Kontrollfähigkeit (Kontrollverlust) den Konsum betreffend,
- Vernachlässigung anderer sozialer Aktivitäten zugunsten des Substanzkonsums,
- fortgesetzter Substanzkonsum trotz des Nachweises schädlicher Folgen,
- Toleranzentwicklung,
- körperliche Entzugssymptome nach Beenden des Substanzkonsums.

Es gelten folgende GdS-Werte:

Bei schädlichem Gebrauch von psychotropen Substanzen mit

- leichteren psychischen Störungen beträgt der GdS ..... 0–20

Bei Abhängigkeit:

- mit leichten sozialen Anpassungsschwierigkeiten beträgt der GdS ..... 30–40
- mit mittleren sozialen Anpassungsschwierigkeiten beträgt der GdS .... 50–70
- mit schweren sozialen Anpassungsschwierigkeiten beträgt der GdS ... 80–100

Ist im Fall einer Abhängigkeit, die zuvor mit einem GdS von mindestens 50 zu bewerten war, Abstinenz erreicht, muss eine Heilungsbewährung von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt des Beginns der Abstinenz abgewartet werden. Während dieser Zeit ist ein GdS von 30 anzunehmen, es sei denn, die bleibenden psychischen oder hirnorganischen Störungen rechtfertigen einen höheren GdS. Weitere Organschäden sind unter Beachtung von Teil A Nummer 2 Buchstabe e der Versorgungsmedizinischen Grundsätze zu bewerten.

Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle sind nach Teil B Nummer 3.7 zu bewerten.

### 3.9 Rückenmarkschäden

Unvollständige, leichte Halsmarkschädigung mit beidseits geringen motorischen und sensiblen Ausfällen, ohne Störungen der Blasen- und Mastdarmfunktion .....	30 – 60
Unvollständige Brustmark-, Lendenmark- oder Kaudaschädigung mit Teillähmung beider Beine, ohne Störungen der Blasen- und Mastdarmfunktion. ....	30 – 60
Unvollständige Brustmark-, Lendenmark- oder Kaudaschädigung mit Teillähmung beider Beine und Störungen der Blasen- und/oder Mastdarmfunktion .....	60 – 80
Unvollständige Halsmarkschädigung mit gewichtigen Teillähmungen beider Arme und Beine und Störungen der Blasen- und/oder Mastdarmfunktion .....	100
Vollständige Halsmarkschädigung mit vollständiger Lähmung beider Arme und Beine und Störungen der Blasen- und/oder Mastdarmfunktion .....	100
Vollständige Brustmark-, Lendenmark-, oder Kaudaschädigung mit vollständiger Lähmung der Beine und Störungen der Blasen und/oder Mastdarmfunktion .....	100

### 3.10 Multiple Sklerose

Der GdS richtet sich vor allem nach den zerebralen und spinalen Ausfallserscheinungen. Zusätzlich ist die aus dem klinischen Verlauf sich ergebende Krankheitsaktivität zu berücksichtigen.

### 3.11 Polyneuropathien

Bei den Polyneuropathien ergeben sich die Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund motorischer Ausfälle (mit Muskelatrophien), sensibler Störungen oder Kombinationen

von beiden. Der GdS motorischer Ausfälle ist in Analogie zu den peripheren Nervenschäden einzuschätzen. Bei den sensiblen Störungen und Schmerzen ist zu berücksichtigen, dass schon leichte Störungen zu Beeinträchtigungen – z.B. bei Feinbewegungen – führen können.

## 4. Sehorgan

4

Die Sehbehinderung umfasst alle Störungen des Sehvermögens. Für die Beurteilung ist in erster Linie die korrigierte Sehschärfe maßgebend; daneben sind u.a. Ausfälle des Gesichtsfeldes und des Blickfeldes zu berücksichtigen.

Die Sehschärfe ist grundsätzlich entsprechend den Empfehlungen der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) nach DIN 58220 zu bestimmen; Abweichungen hiervon sind nur in Ausnahmefällen zulässig (zum Beispiel bei Bettlägerigkeit oder Kleinkindern). Die übrigen Partialfunktionen des Sehvermögens sind nur mit Geräten oder Methoden zu prüfen, die den Empfehlungen der DOG entsprechend eine gutachtenrelevante einwandfreie Beurteilung erlauben.

Hinsichtlich der Gesichtsfeldbestimmung bedeutet dies, dass zur Feststellung von Gesichtsfeldausfällen nur Ergebnisse der manuell-kinetischen Perimetrie entsprechend der Marke Goldmann III/4e verwertet werden dürfen.

Bei der Beurteilung von Störungen des Sehvermögens ist darauf zu achten, dass der morphologische Befund die Sehestörungen erklärt.

Die Grundlage für die GdS-Beurteilung bei Herabsetzung der Sehschärfe bildet die „MdE-Tabelle der DOG“.

### 4.1 Verlust eines Auges mit dauernder, einer Behandlung nicht zugänglichen Eiterung der Augenhöhle ..... 40

### 4.2 Linsenverlust

Linsenverlust korrigiert durch intraokulare Kunstlinse oder Kontaktlinse

Linsenverlust eines Auges

Sehschärfe 0,4 und mehr .....	10
Sehschärfe 0,1 bis weniger als 0,4 .....	20
Sehschärfe weniger als 0,1 .....	25–30

Linsenverlust beider Augen

Beträgt der sich aus der Sehschärfe für beide Augen ergebende GdS nicht mehr als 60, ist dieser um 10 zu erhöhen.

Die GdS-Werte setzen die Verträglichkeit der Linsen voraus. Maßgebend ist der objektive Befund.

Bei Versorgung mit Starbrille ist der aus der Sehschärfe für beide Augen sich ergebende GdS um 10 zu erhöhen, bei Blindheit oder Verlust des anderen Auges um 20.

Bei Unkorrigierbarkeit richtet sich der GdS nach der Restsehschärfe.

**4.3 Die augenärztliche Untersuchung umfasst die Prüfung der einäugigen und beidäugigen Sehschärfe. Sind die Ergebnisse beider Prüfungsarten unterschiedlich, so ist bei der Bewertung die beidäugige Sehschärfe als Sehschärfewert des besseren Auges anzusetzen.**

**MdE-Tabelle der DOG**


RA \ LA		RA													
		1,0	0,8	0,63	0,5	0,4	0,32	0,25	0,2	0,6	0,1	0,08	0,05	0,02	0
		5/5	5/6	5/8	5/10	5/12	5/15	5/20	5/25	5/30	5/50	1/12	1/20	1/50	0
1,0	5/5	0	0	0	5	5	10	10	10	15	20	20	25	25	*25
0,8	5/6	0	0	5	5	10	10	10	15	20	20	25	30	30	30
0,63	5/8	0	5	10	10	10	10	15	20	20	25	30	30	30	40
0,5	5/10	5	5	10	10	10	15	20	20	25	30	30	35	40	40
0,4	5/12	5	10	10	10	20	20	25	25	30	30	35	40	50	50
0,32	5/15	10	10	10	15	20	30	30	30	40	40	40	50	50	50
0,25	5/20	10	10	15	20	25	30	40	40	40	50	50	50	60	60
0,2	5/25	10	15	20	20	25	30	40	50	50	50	60	60	70	70
0,16	5/30	15	20	20	25	30	40	40	50	60	60	60	70	80	80
0,1	5/50	20	20	25	30	30	40	50	50	60	70	70	80	90	90
0,08	1/12	20	25	30	30	35	40	50	60	60	70	80	90	90	90
0,05	1/20	25	30	30	35	40	50	50	60	70	80	90	100	100	100
0,02	1/50	25	30	30	40	50	50	60	70	80	90	90	100	100	100
0	0	*25	30	40	40	50	50	60	70	80	90	90	100	100	100



## 4.4 Augenmuskellähmungen, Strabismus

wenn ein Auge wegen der Doppelbilder vom Sehen ausgeschlossen werden muss ..... 30

bei Doppelbildern nur in einigen Blickfeldbereichen bei sonst normalem Binokularsehen ergibt sich der GdS aus dem nachstehenden Schema von Haase und Steinhorst:



bei einseitiger Bildunterdrückung durch Gewöhnung (Exklusion) und entsprechendem Verschwinden der Doppelbilder ..... 10

Einschränkungen der Sehschärfe (z.B. Amblyopie) oder eine erheblich entstellende Wirkung sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Lähmung des Oberlides mit nicht korrigierbarem, vollständigem Verschluss des Auges. .... 30

sonst ..... 10 – 20

Fehlstellungen der Lider, Verlegung der Tränenwege mit Tränenträufeln

einseitig .....	0 – 10
beidseitig .....	10 – 20

## 4.5 Gesichtsfeldausfälle

Vollständige Halbseiten- und Quadrantenausfälle

Homonyme Hemianopsie .....	40
Bitemporale Hemianopsie .....	30
Binasale Hemianopsie	
bei beidäugigem Sehen .....	10
bei Verlust des beidäugigen Sehens .....	30
Homonymer Quadrant oben .....	20
Homonymer Quadrant unten .....	30
Vollständiger Ausfall beider unterer Gesichtsfeldhälften .....	60

Ausfall einer Gesichtsfeldhälfte bei Verlust oder Blindheit des anderen Auges

nasal .....	60
temporal .....	70

Bei unvollständigen Halbseiten- und Quadrantenausfällen ist der GdS entsprechend niedriger anzusetzen.

Gesichtsfeldeinengungen

Allseitige Einengung bei normalem Gesichtsfeld des anderen Auges

auf 10° Abstand vom Zentrum .....	10
auf 5° Abstand vom Zentrum .....	25

Allseitige Einengung binokular

auf 50° Abstand vom Zentrum .....	10
auf 30° Abstand vom Zentrum .....	30
auf 10° Abstand vom Zentrum .....	70
auf 5° Abstand vom Zentrum .....	100

GdS-Tabelle

Allseitige Einengung bei Fehlen des anderen Auges	
auf 50° Abstand vom Zentrum .....	40
auf 30° Abstand vom Zentrum .....	60
auf 10° Abstand vom Zentrum .....	90
auf 5° Abstand vom Zentrum .....	100
Unregelmäßige Gesichtsfeldausfälle, Skotome im 50°-Gesichtsfeld unterhalb des horizontalen Meridians, binokular	
mindestens 1/3 ausgefallene Fläche .....	20
mindestens 2/3 ausgefallene Fläche .....	50
Bei Fehlen eines Auges sind die Skotome entsprechend höher zu bewerten.	
<b>4.6 Ausfall des Farbensinn</b> .....	<b>0</b>
Einschränkung der Dunkeladaptation (Nachtblindheit) oder des Dämmerungssehens .....	0 – 10
<b>4.7 Nach Hornhauttransplantationen richtet sich der GdS allein nach dem Sehvermögen.</b>	
<b>4.8 Nach Entfernung eines malignen Augentumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten; GdS während dieser Zeit</b>	
bei Tumorbegrenzung auf den Augapfel (auch bei Augapfelentfernung) .....	50
sonst .....	wenigstens 80

**5. Hör- und Gleichgewichtsorgan**

Maßgebend für die Bewertung des GdS bei Hörstörungen ist die Herabsetzung des Sprachgehörs, deren Umfang durch Prüfung ohne Hörhilfen zu bestimmen ist. Der Beurteilung ist die von der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie empfohlene Tabelle (siehe Nummer 5.2.4, Tabelle D) zugrunde zu legen. Nach Durchführung eines Ton- und Sprachaudiogramms ist der Prozentsatz des Hörverlustes aus entsprechenden Tabellen abzuleiten.

Die in der GdS-Tabelle enthaltenen Werte zur Schwerhörigkeit berücksichtigen die Möglichkeit eines Teilausgleichs durch Hörhilfen mit.

Sind mit der Hörstörung andere Erscheinungen verbunden, z.B. Ohrgeräusche, Gleichgewichtsstörungen, Artikulationsstörungen oder außergewöhnliche psycho-reaktive Störungen, so kann der GdS entsprechend höher bewertet werden.

### 5.1 Angeborene oder in der Kindheit erworbene Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit mit Sprachstörungen

- angeboren oder bis zum 7. Lebensjahr erworben  
(schwere Störung des Spracherwerbs, in der Regel lebenslang) ..... 100
- später erworben (im 8. bis 18. Lebensjahr) mit schweren Sprachstörungen  
(schwer verständliche Lautsprache, geringer Sprachschatz) ..... 100
- sonst je nach Sprachstörung ..... 80 – 90

### 5.2 Hörverlust

#### 5.2.1 Zur Ermittlung des prozentualen Hörverlustes aus den Werten der sprachaudiometrischen Untersuchung (nach Boenninghaus u. Röser 1973):

Tabelle A

		Hörverlust für Zahlen in dB										
		< 20	ab 20	ab 25	ab 30	ab 35	ab 40	ab 45	ab 50	ab 55	ab 60	ab 65
Gesamtwortverstehen	< 20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ab 20	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100
	ab 35	90	90	90	90	90	90	90	90	90	95	100
	ab 50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	90	100
	ab 75	70	70	70	70	70	70	70	70	80	90	100
	ab 100	60	60	60	60	60	60	60	70	80	90	
	ab 125	50	50	50	50	50	50	60	70	80	90	
	ab 150	40	40	40	40	40	50	60	70	80		
	ab 175	30	30	30	30	40	50	60	70			
	ab 200	20	20	20	30	40	50	60				
	ab 225	10	10	20	30	40	50					
	ab 250	0	10	20	30	40						

Das Gesamtwortverstehen wird aus der Wortverständniskurve errechnet. Es entsteht durch Addition der Verständnisquoten bei 60, 80 und 100 dB Lautstärke (einfaches). Bei der Ermittlung von Schwierigkeiten bis zu einem Hörverlust von 40% ist das gewichtete Gesamtwortverstehen (Feldmann 1988) anzuwenden: 3 x Verständnisquote bei 60 dB + 2 x Verständnisquote bei 80 dB + 1 x Verständnisquote, Summe dividiert durch 2.

**5.2.2 Zur Ermittlung des prozentualen Hörverlustes aus dem Tonaudiogramm bei unregelmäßigem Verlauf der Tongehörskurve. Der prozentuale Hörverlust ergibt sich durch Addition der vier Teilkomponenten (4-Frequenztable nach Röser 1973):**

Tabelle B

Tonhörverlust dB	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
10	0	0	0	0
15	2	3	2	1
20	3	5	5	2
25	4	8	7	4
30	6	10	9	5
35	8	13	11	6
40	9	16	13	7
45	11	18	16	8
50	12	21	18	9
55	14	24	20	10
60	15	26	23	11
65	17	29	25	12
70	18	32	27	13
75	19	32	28	14
80	19	33	29	14
ab 85	20	35	30	15

## 5.2.3 3-Frequenztafel nach Röser 1980 für die Beurteilung bei Hochtonverlusten vom Typ Lärmschwerhörigkeit:

**Tabelle C**

	dB von bis	Tonverlust bei 1 kHz																					
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Summe bei 2 und 3 kHz	0-15	0	0	0	0	0	0	5	5	Hörverlust in %													
	20-35	0	0	0	0	0	5	10	20	30													
	40-55	0	0	0	0	0	10	20	25	35 45													
	60-75	0	0	10	15	25	35	40	50	60													
	80-95	0	5	15	25	30	40	50	60	70	80												
	100-115	5	15	20	30	40	45	55	70	80	90	100											
	120-135	10	20	30	35	45	55	65	75	90	100	100											
	140-155	20	25	35	45	50	60	75	85	95	100	100											
	160-175	25	35	40	50	60	70	80	95	100	100	100											
	180-195	30	40	50	55	70	80	90	100	100	100	100											
ab 200	40	45	55	65	75	90	100	100	100	100	100												

5.2.4 Zur Ermittlung des GdS aus den Schwerhörigkeitsgraden für beide Ohren:

Tabelle D

Rechtes Ohr	Normalhörigkeit	0–20	0	10	0	10	10	15	20
	Geringgradige Schwerhörigkeit	20–40	0	15	20	0	20	30	30
	Mittelgradige Schwerhörigkeit	40–60	10	20	30	40	30	40	40
	Hochgradige Schwerhörigkeit	60–80	10	20	30	50	60	50	50
	An Taubheit grenzende Schwerhörigkeit	80–95	15	30	40	50	70	80	80
	Taubheit	100	20	30	40	50	70	80	80
		Hörverlust in Prozent	0–20	20–40	40–60	60–80	80–95	100	
			Normalhörigkeit	Geringgradige Schwerhörigkeit	Mittelgradige Schwerhörigkeit	Hochgradige Schwerhörigkeit	An Taubheit grenzende Schwerhörigkeit	Taubheit	
Linkes Ohr									

## 5.3 Gleichgewichtsstörungen

(Normabweichungen in den apparativ erhobenen neurootologischen Untersuchungsbefunden bedingen für sich allein noch keinen GdS)

ohne wesentliche Folgen

beschwerdefrei, allenfalls Gefühl der Unsicherheit bei alltäglichen Belastungen (z.B. Gehen, Bücken, Aufrichten, Kopfdrehungen, leichte Arbeiten in wechselnder Körperhaltung)

leichte Unsicherheit, geringe Schwindelerscheinungen (Schwanken) bei höheren Belastungen (z.B. Heben von Lasten, Gehen im Dunkeln, abrupte Körperbewegungen)

stärkere Unsicherheit mit Schwindelerscheinungen (Fallneigung, Ziehen nach einer Seite) erst bei außergewöhnlichen Belastungen (z.B. Stehen und Gehen auf Gerüsten, sportliche Übungen mit raschen Körperbewegungen)

keine nennenswerten Abweichungen bei den Geh- und Stehversuchen ..... 0 – 10

mit leichten Folgen

leichte Unsicherheit, geringe Schwindelerscheinungen wie Schwanken, Stolpern, Ausfallsschritte bei alltäglichen Belastungen,

stärkere Unsicherheit und Schwindelerscheinungen bei höheren Belastungen

leichte Abweichungen bei den Geh- und Stehversuchen erst auf höherer Belastungsstufe ..... 20

mit mittelgradigen Folgen

stärkere Unsicherheit, Schwindelerscheinungen mit Fallneigung bereits bei alltäglichen Belastungen,

heftiger Schwindel (mit vegetativen Erscheinungen, gelegentlich Übelkeit, Erbrechen) bei höheren und außergewöhnlichen Belastungen

deutliche Abweichungen bei den Geh- und Stehversuchen bereits auf niedriger Belastungsstufe ..... 30 – 40

mit schweren Folgen

heftiger Schwindel, erhebliche Unsicherheit und Schwierigkeiten bereits beim Gehen und Stehen im Hellen und bei anderen alltäglichen Belastungen, teilweise Gehhilfe erforderlich ..... 50 – 70

bei Unfähigkeit, ohne Unterstützung zu gehen oder zu stehen ..... 80



GdS-Tabelle

Ohrgeräusche (Tinnitus)

ohne nennenswerte psychische Begleiterscheinungen .....	0 – 10
mit erheblichen psychovegetativen Begleiterscheinungen .....	20
mit wesentlicher Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit (z.B. ausgeprägte depressive Störungen).....	30-40
mit schweren psychischen Störungen und sozialen Anpassungsschwierigkeiten.....	mindestens 50

Menière-Krankheit

ein bis zwei Anfälle im Jahr .....	0 – 10
häufigere Anfälle, je nach Schweregrad .....	20 – 40
mehrmals monatlich schwere Anfälle.....	50
Bleibende Hörstörungen und Ohrgeräusche (Tinnitus) sind zusätzlich zu bewerten.	

**5.4 Chronische Mittelohrentzündung**

ohne Sekretion oder einseitige zeitweise Sekretion.....	0
einseitige andauernde Sekretion oder zeitweise beidseitige Sekretion.....	10
andauernd beidseitige Sekretion .....	20

Radikaloperationshöhle

reizlos .....	0
bei unvollständiger Überhäutung und ständiger Sekretion	
einseitig .....	10
beidseitig .....	20

**5.5 Verlust einer Ohrmuschel..... 20**

**6. Nase**

**6.1 Völliger Verlust der Nase..... 50**

Teilverlust der Nase, Sattelnase

wenig störend .....	10
sonst .....	20 – 30

**6.2 Stinknase (Ozaena), je nach Ausmaß der Borkenbildung und des Foetors ..... 20 – 40**

- Verengung der Nasengänge
  - einseitig je nach Atembehinderung ..... 0 – 10
  - doppelseitig mit leichter bis mittelgradiger Atembehinderung ..... 10
  - doppelseitig mit starker Atembehinderung ..... 20

- Chronische Nebenhöhlenentzündung
  - leichteren Grades  
(ohne wesentliche Neben- und Folgeerscheinungen) ..... 0 – 10
  - schweren Grades  
(ständige erhebliche Eiterabsonderung, Trigemiusreizerscheinungen, Polypenbildung) ..... 20 – 40

**6.3 Völliger Verlust des Riechvermögens mit der damit verbundenen Beeinträchtigung der Geschmackswahrnehmung ..... 15**

- Völliger Verlust des Geschmackssinns ..... 10

**7 7. Mundhöhle, Rachenraum und obere Luftwege**

---

Verletzungs- und Erkrankungsfolgen an den Kiefern, Kiefergelenken und Weichteilen der Mundhöhle, einschließlich der Zunge und der Speicheldrüsen, sind nach dem Grad ihrer Auswirkung auf Sprech-, Kau- und Schluckvermögen zu beurteilen. Eine Gesichtsentstellung ist gesondert zu berücksichtigen.

**7.1 Lippendefekt mit ständigem Speichelfluss ..... 20 – 30**

- Äußere Speichelfistel, Frey-Syndrom
  - geringe Sekretion ..... 10
  - sonst ..... 20
- Störung der Speichelsekretion  
(vermehrter Speichelfluss, Mundtrockenheit) ..... 0 – 20

**7.2 Schwere Funktionsstörung der Zunge durch Gewebsverlust, narbige Fixierung oder Lähmung je nach Umfang und Artikulationsstörung ..... 30 – 50**

- Behinderung der Mundöffnung  
(Schneidekantendistanz zwischen 5 und 25 mm) mit deutlicher Auswirkung auf die Nahrungsaufnahme ..... 20 – 40

## GdS-Tabelle

Kieferklemme mit Notwendigkeit der Aufnahme flüssiger oder passierter Nahrung und entsprechenden Sprechstörungen .....	50
<b>7.3 Verlust eines Teiles des Unterkiefers mit schlaffer Pseudarthrose</b>	
ohne wesentliche Beeinträchtigung der Kaufunktion und Artikulation .....	0 – 10
mit erheblicher Beeinträchtigung der Kaufunktion und Artikulation .....	20 – 50
Verlust eines Teiles des Oberkiefers	
ohne wesentliche kosmetische und funktionelle Beeinträchtigung .....	0 – 10
mit entstellender Wirkung, wesentlicher Beeinträchtigung der Nasen- und Nebenhöhlen (Borkenbildung, ständige Sekretion) .....	20 – 40
<b>7.4 Umfassender Zahnverlust über 1/2 Jahr hinaus prothetisch nur unzureichend zu versorgen .....</b>	
	<b>10 – 20</b>
Verlust erheblicher Teile des Alveolarfortsatzes mit wesentlicher, prothetisch nicht voll ausgleichbarer Funktionsbehinderung .....	20
<b>7.5 Ausgedehnter Defekt des Gaumens mit gut sitzender Defektprothese .....</b>	
	<b>30</b>
Verlust des Gaumens ohne Korrekturmöglichkeit durch geeignete Prothese (Störung der Nahrungsaufnahme) .....	50
<b>7.6 Lippen-, Kiefer-, Gaumen- und Segelspalten bei Kindern, bis zum Abschluss der Behandlung</b>	
Isolierte voll ausgebildete Lippenspalte (ein- oder beidseitig)	
bis zum Abschluss der Behandlung (in der Regel ein Jahr nach der Operation) je nach Trinkstörung, Beeinträchtigung der mimischen Muskulatur und Störung der Lautbildung .....	30 – 50
Lippen-Kieferspalte	
bis zum Abschluss der Erstbehandlung (in der Regel ein Jahr nach der Operation) .....	60 – 70
bis zum Verschluss der Kieferspalte .....	50
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte	
bis zum Abschluss der Erstbehandlung (in der Regel ein Jahr nach der Operation) unter Mitberücksichtigung der regelhaft damit verbundenen Hörstörung (Tubenfehlbelüftung) und der Störung der Nasenatmung .....	100

bis zum Verschluss der Kieferspalte ..... 50

Komplette Gaumen- und Segelspalte ohne Kieferspalte

wegen der bis zum Abschluss der Erstbehandlung (in der Regel ein Jahr nach der Operation) bestehenden mit der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte vergleichbaren Auswirkungen ..... 100

Isolierte Segelspalte, submuköse Gaumenspalte bis zum Abschluss der Behandlung je nach Ausmaß der Artikulationsstörung ..... 0 – 30

Ausgeprägte Hörstörungen sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Nach Abschluss der Behandlung richtet sich der GdS immer nach der verbliebenen Gesundheitsstörung.

**7.7 Schluckstörungen**

ohne wesentliche Behinderung der Nahrungsaufnahme je nach Beschwerden ..... 0 – 10

mit erheblicher Behinderung der Nahrungsaufnahme je nach Auswirkung (Einschränkung der Kostform, verlängerte Essdauer) ..... 20 – 40

mit häufiger Aspiration und erheblicher Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes ..... 50 – 70

**7.8 Verlust des Kehlkopfes**

bei guter Ersatzstimme und ohne Begleiterscheinungen, unter Mitberücksichtigung der Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit (fehlende Bauchpresse) ..... 70

in allen anderen Fällen ..... 80

Anhaltende schwere Bronchitiden und Beeinträchtigungen durch Nervenlähmungen im Hals- und Schulterbereich sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Bei Verlust des Kehlkopfes wegen eines malignen Tumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten; GdB bzw. GdS während dieser Zeit ..... 100

Teilverlust des Kehlkopfes

je nach Sprechfähigkeit und Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit ..... 20 – 50

Bei Teilverlust des Kehlkopfes wegen eines malignen Tumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten; GdS während dieser Zeit

bei Geschwulstentfernung im Frühstadium (T1 N0 M0) ..... 50 – 60

## GdS-Tabelle

sonst ..... 80

**7.9 Tracheostoma**

reizlos oder mit geringen Reizerscheinungen (Tracheitis, Bronchitis),  
gute Sprechstimme ..... 40

mit erheblichen Reizerscheinungen und/oder erheblicher  
Beeinträchtigung der Sprechstimme bis zum Verlust der  
Sprechfähigkeit (z.B. bei schweren Kehlkopfveränderungen) ..... 50 – 80

Einschränkungen der Atemfunktion sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

## Trachealstenose ohne Tracheostoma

Der GdS ist je nach Atembehinderung analog der dauernden Einschränkung  
der Lungenfunktion zu beurteilen.

**7.10 Funktionelle und organische Stimmstörungen (z.B. Stimmbandlähmung)**

mit geringer belastungsabhängiger Heiserkeit ..... 0 – 10

mit dauernder Heiserkeit ..... 20 – 30

nur Flüsterstimme ..... 40

mit völliger Stimmlosigkeit ..... 50

Atembehinderungen sind ggf. zusätzlich zu bewerten analog der dauernden Ein-  
schränkung der Lungenfunktion.

**7.11 Artikulationsstörungen**

## durch Lähmungen oder Veränderungen in Mundhöhle oder Rachen

mit verständlicher Sprache ..... 10

mit schwer verständlicher Sprache ..... 20 – 40

mit unverständlicher Sprache ..... 50

## Stottern

leicht ..... 0 – 10

mittelgradig, situationsunabhängig ..... 20

schwer, auffällige Mitbewegungen ..... 30 – 40

mit unverständlicher Sprache ..... 50

Außergewöhnliche psychoreaktive Störungen einschließlich somatoformer  
Störungen sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

**8 8. Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen**

Bei chronischen Krankheiten der Bronchien und des Lungenparenchyms sowie bei Brustfellschwarten richtet sich der GdS vor allem nach der klinischen Symptomatik mit ihren Auswirkungen auf den Allgemeinzustand. Außerdem sind die Einschränkung der Lungenfunktion, die Folgeerscheinungen an anderen Organsystemen (z.B. Cor pulmonale) und bei allergisch bedingten Krankheiten auch die Vermeidbarkeit der Allergene zu berücksichtigen.

**8.1 Brüche und Defekte der Knochen des Brustkorbs (Rippen, Brustbein, Schlüsselbein)**

ohne Funktionsstörungen verheilt, je nach Ausdehnung des Defektes .....	0 – 10
Rippendefekte mit Brustfellschwarten	
ohne wesentliche Funktionsstörung .....	0 – 10
bei sehr ausgedehnten Defekten einschließlich entstellender Wirkung .....	20
Brustfellverwachsungen und -schwarten	
ohne wesentliche Funktionsstörung .....	0 – 10
Fremdkörper im Lungengewebe oder in der Brustkorbwand	
reaktionslos eingeheilt .....	0

**8.2 Chronische Bronchitis, Bronchiektasen**

als eigenständige Krankheiten – ohne dauernde Einschränkung der Lungenfunktion,	
leichte Form (symptomfreie Intervalle über mehrere Monate, wenig Husten, geringer Auswurf) .....	0 – 10
schwere Form (fast kontinuierlich ausgiebiger Husten und Auswurf, häufige akute Schübe) .....	20 – 30
Pneumokoniosen (z.B. Silikose, Asbestose)	
ohne wesentliche Einschränkung der Lungenfunktion .....	0 – 10

**8.3 Krankheiten der Atmungsorgane mit dauernder Einschränkung der Lungenfunktion**

geringen Grades

das gewöhnliche Maß übersteigende Atemnot bei mittelschwerer Belastung (z.B. forsches Gehen [5 – 6 km/h], mittelschwere körperliche Arbeit); statische und dynamische Messwerte der Lungenfunktionsprüfung bis zu 1/3 niedriger als die Sollwerte, Blutgaswerte im Normbereich ..... 20 – 40

mittleren Grades

das gewöhnliche Maß übersteigende Atemnot bereits bei alltäglicher leichter Belastung (z.B. Spaziergehen [3 – 4 km/h], Treppensteigen bis zu einem Stockwerk, leichte körperliche Arbeit); statische und dynamische Messwerte der Lungenfunktionsprüfung bis zu 2/3 niedriger als die Sollwerte, respiratorische Partialinsuffizienz ..... 50 – 70

schweren Grades

Atemnot bereits bei leichtester Belastung oder in Ruhe; statische und dynamische Messwerte der Lungenfunktionsprüfung um mehr als 2/3 niedriger als die Sollwerte, respiratorische Globalinsuffizienz ..... 80 – 100

**8.4 Nach einer Lungentransplantation ist eine Heilungsbewährung abzuwarten (im Allgemeinen zwei Jahre); während dieser Zeit ist ein GdS von 100 anzusetzen. Danach ist der GdS selbst bei günstigem Heilungsverlauf unter Mitberücksichtigung der erforderlichen Immunsuppression nicht niedriger als 70 zu bewerten.**

Nach Entfernung eines malignen Lungentumors oder eines Bronchialtumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten.

GdS während dieser Zeit ..... wenigstens 80  
 bei Einschränkung der Lungenfunktion  
 mittleren bis schweren Grades ..... 90 – 100

**8.5 Bronchialasthma ohne dauernde Einschränkung der Lungenfunktion,**

Hyperreagibilität mit seltenen (saisonalen) und/oder leichten Anfällen ..... 0 – 20  
 Hyperreagibilität mit häufigen (mehrmals pro Monat) und/oder schweren Anfällen ..... 30 – 40  
 Hyperreagibilität mit Serien schwerer Anfälle ..... 50

Eine dauernde Einschränkung der Lungenfunktion ist zusätzlich zu berücksichtigen.

## 8.6 Bronchialasthma bei Kindern

geringen Grades

(Hyperreagibilität mit seltenen (saisonalen) und/oder leichten Anfällen, keine dauernde Einschränkung der Atemfunktion, nicht mehr als sechs Wochen Bronchitis im Jahr) ..... 20 – 40

mittleren Grades

(Hyperreagibilität mit häufigeren und/oder schweren Anfällen, leichte bis mittelgradige ständige Einschränkung der Atemfunktion, etwa 2 bis 3 Monate kontinuierliche Bronchitis im Jahr) ..... 50 – 70

schweren Grades

(Hyperreagibilität mit Serien schwerer Anfälle, schwere Beeinträchtigung der Atemfunktion, mehr als 3 Monate kontinuierliche Bronchitis im Jahr)..... 80 – 100

## 8.7 Schlaf-Apnoe-Syndrom (Nachweis durch Untersuchung im Schlaflabor)

ohne Notwendigkeit einer kontinuierlichen nasalen Überdruckbeatmung ..... 0-10

mit Notwendigkeit einer kontinuierlichen nasalen Überdruckbeatmung ..... 20

bei nicht durchführbarer nasaler Überdruckbeatmung ..... 50

Folgeerscheinungen oder Komplikationen (z.B. Herzrhythmusstörungen, Hypertonie, Cor pulmonale) sind zusätzlich zu berücksichtigen.

## 8.8 Tuberkulose

Tuberkulöse Pleuritis

Der GdS richtet sich nach den Folgeerscheinungen.

Lungentuberkulose

ansteckungsfähig (mehr als 6 Monate andauernd) ..... 100

nicht ansteckungsfähig

ohne Einschränkung der Lungenfunktion ..... 0

sonst je nach Einschränkung der Lungenfunktion.



## 8.9 Sarkoidose

Der GdS richtet sich nach der Aktivität mit ihren Auswirkungen auf den Allgemeinzustand und nach den Auswirkungen an den verschiedenen Organen.

Bei chronischem Verlauf mit klinischen Aktivitätszeichen und Auswirkungen auf den Allgemeinzustand ist ohne Funktionseinschränkung von betroffenen Organen ein GdS von 30 anzunehmen.

## 9. Herz und Kreislauf

9

Für die Bemessung des GdS ist weniger die Art einer Herz- oder Kreislaufkrankheit maßgeblich als die Leistungseinbuße. Bei der Beurteilung des GdS ist zunächst von dem klinischen Bild und von den Funktionseinschränkungen im Alltag auszugehen. Ergometerdaten und andere Parameter stellen Richtwerte dar, die das klinische Bild ergänzen. Elektrokardiographische Abweichungen allein gestatten keinen Rückschluss auf die Leistungseinbuße.

### 9.1 Krankheiten des Herzens

#### 9.1.1 Einschränkung der Herzleistung:

1. Keine wesentliche Leistungsbeeinträchtigung (keine Insuffizienz-erscheinungen wie Atemnot, anginöse Schmerzen) selbst bei gewohnter stärkerer Belastung (z.B. sehr schnelles Gehen [7 – 8 km/h], schwere körperliche Arbeit), keine Einschränkung der Solleistung bei Ergometerbelastung; bei Kindern und Säuglingen (je nach Alter) beim Strampeln, Krabbeln, Laufen, Treppensteigen keine wesentliche Leistungsbeeinträchtigung, keine Tachypnoe, kein Schwitzen ..... 0 – 10
2. Leistungsbeeinträchtigung bei mittelschwerer Belastung (z.B. forsches Gehen [5 – 6 km/h], mittelschwere körperliche Arbeit), Beschwerden und Auftreten pathologischer Messdaten bei Ergometerbelastung mit 75 Watt (wenigstens 2 Minuten); bei Kindern und Säuglingen Trinkschwierigkeiten, leichtes Schwitzen, leichte Tachy- und Dyspnoe, leichte Zyanose, keine Stauungsorgane, Beschwerden und Auftreten pathologischer Messdaten bei Ergometerbelastung mit 1 Watt/kg Körpergewicht ..... 20 – 40
3. Leistungsbeeinträchtigung bereits bei alltäglicher leichter Belastung (z.B. Spaziergehen [3 – 4 km/h], Treppensteigen bis zu einem Stockwerk, leichte körperliche Arbeit), Beschwerden und Auftreten pathologischer Messdaten bei Ergometerbelastung mit 50 Watt (wenigstens 2 Minuten); bei Kindern und Säuglingen deutliche Trinkschwierigkeiten, deutliches Schwitzen, deutliche

Tachy- und Dyspnoe, deutliche Zyanose, rezidivierende pulmonale Infekte, kardial bedingte Gedeihstörungen, Beschwerden und Auftreten pathologischer Messdaten bei Ergometerbelastung mit 0,75 Watt/kg Körpergewicht .....	50 – 70
mit gelegentlich auftretenden, vorübergehend schweren Dekompensationserscheinungen .....	80
4. Leistungsbeeinträchtigung bereits in Ruhe (Ruheinsuffizienz, z.B. auch bei fixierter pulmonaler Hypertonie); bei Kindern und Säuglingen auch hypoxämische Anfälle, deutliche Stauungsorgane, kardiale Dystrophie .....	90 – 100

(Die für Erwachsene angegebenen Wattzahlen sind auf mittleres Lebensalter und Belastung im Sitzen bezogen.)

Liegen weitere objektive Parameter zur Leistungsbeurteilung vor, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Notwendige körperliche Leistungsbeschränkungen (z.B. bei höhergradiger Aortenklappenstenose, hypertrophischer obstruktiver Kardiomyopathie) sind wie Leistungsbeeinträchtigungen zu bewerten.

**9.1.2 Nach operativen und anderen therapeutischen Eingriffen am Herzen ist der GdS von der bleibenden Leistungsbeeinträchtigung abhängig. Bei Herzklappenprothesen ist der GdS nicht niedriger als 30 zu bewerten; dieser Wert schließt eine Dauerbehandlung mit Antikoagulantien ein.**

**9.1.3 Nach einem Herzinfarkt ist der GdS von der bleibenden Leistungsbeeinträchtigung abhängig.**

**9.1.4 Nach Herztransplantation ist eine Heilungsbewährung abzuwarten (im Allgemeinen zwei Jahre); während dieser Zeit ist ein GdS von 100 anzusetzen. Danach ist der GdS selbst bei günstigem Heilungsverlauf unter Berücksichtigung der erforderlichen Immunsuppression nicht niedriger als 70 zu bewerten.**

**9.1.5 Fremdkörper im Herzmuskel oder Herzbeutel**

reaktionslos eingeheilt .....	0
mit Beeinträchtigung der Herzleistung.....	siehe oben

**9.1.6 Rhythmusstörungen**

Die Beurteilung des GdS richtet sich vor allem nach der Leistungsbeeinträchtigung des Herzens.

Anfallsweise auftretende hämodynamisch relevante Rhythmusstörungen (z.B. paroxysmale Tachykardien) je nach Häufigkeit, Dauer und subjektiver

GdS-Tabelle

Beeinträchtigung bei fehlender andauernder Leistungsbeeinträchtigung des Herzens ..... 10 – 30

Bei bestehender andauernder Leistungsbeeinträchtigung des Herzens sind sie entsprechend zusätzlich zu bewerten.

nach Implantation eines Herzschrittmachers ..... 10

nach Implantation eines Kardioverter-Defibrillators wenigstens ..... 50

bei ventrikulären tachykarden Rhythmusstörungen im Kindesalter ohne Implantation eines Kardioverter-Defibrillators ..... wenigstens 60

**9.2 Gefäßkrankheiten**

**9.2.1 Arterielle Verschlusskrankheiten, Arterienverschlüsse an den Beinen (auch nach rekanalisierenden Maßnahmen)**

mit ausreichender Restdurchblutung, Pulsausfall ohne Beschwerden oder mit geringen Beschwerden (Missempfindungen in Wade und Fuß bei raschem Gehen) ein- oder beidseitig ..... 0 – 10

mit eingeschränkter Restdurchblutung (Claudicatio intermittens) Stadium II

Schmerzen ein- oder beidseitig nach Gehen einer Wegstrecke in der Ebene von mehr als 500 m ..... 20

Schmerzen ein- oder beidseitig nach Gehen einer Wegstrecke in der Ebene von 100 bis 500 m ..... 30 – 40

Schmerzen ein- oder beidseitig nach Gehen einer Wegstrecke in der Ebene von 50 bis 100 m ..... 50 – 60

Schmerzen ein- oder beidseitig nach Gehen einer Wegstrecke in der Ebene von weniger als 50 m

ohne Ruheschmerz ..... 70 – 80

Schmerzen nach Gehen einer Wegstrecke unter 50 m mit Ruheschmerz (Stadium III) einschließlich trophischer Störungen (Stadium IV)

einseitig ..... 80

beidseitig ..... 90 – 100

Apparative Messmethoden (z.B. Dopplerdruck) können nur eine allgemeine Orientierung über den Schweregrad abgeben.

Bei Arterienverschlüssen an den Armen wird der GdS ebenfalls durch das Ausmaß der Beschwerden und Funktionseinschränkungen – im Vergleich mit anderen Schäden an den Armen – bestimmt.

**9.2.2 Nach größeren gefäßchirurgischen Eingriffen (z.B. Prothesenimplantation) mit vollständiger Kompensation einschließlich Dauerbehandlung mit Antikoagulantien . . . . . 20**

Arteriovenöse Fisteln

Der GdS richtet sich nach den hämodynamischen Auswirkungen am Herzen und/oder in der Peripherie.

Aneurysmen (je nach Sitz und Größe)

ohne lokale Funktionsstörung und ohne Einschränkung der Belastbarkeit . . . . . 0 – 10

ohne oder mit nur geringer lokaler Funktionsstörung mit Einschränkung der Belastbarkeit . . . . . 20 – 40

große Aneurysmen . . . . . wenigstens 50

Hierzu gehören immer die dissezierenden Aneurysmen der Aorta und die großen Aneurysmen der Aorta abdominalis und der großen Beckenarterien.

**9.2.3 Unkomplizierte Krampfadern . . . . . 0**

Chronisch-venöse Insuffizienz (z.B. bei Krampfadern), postthrombotisches Syndrom ein- oder beidseitig

mit geringem belastungsabhängigem Ödem, nicht ulzerösen Hautveränderungen, ohne wesentliche Stauungsbeschwerden . . . . . 0 – 10

mit erheblicher Ödembildung, häufig (mehrmals im Jahr) rezidivierenden Entzündungen . . . . . 20 – 30

mit chronischen rezidivierenden Geschwüren, je nach Ausdehnung und Häufigkeit (einschließlich arthrogenes Stauungssyndrom) . . . . . 30 – 50

Lymphödem

an einer Gliedmaße

ohne wesentliche Funktionsbehinderung, Erfordernis einer Kompressionsbandage . . . . . 0 – 10

mit stärkerer Umfangsvermehrung (mehr als 3 cm) je nach Funktionseinschränkung . . . . . 20 – 40

mit erheblicher Beeinträchtigung der Gebrauchsfähigkeit der betroffenen Gliedmaße, je nach Ausmaß . . . . . 50 – 70

bei Gebrauchsunfähigkeit der ganzen Gliedmaße . . . . . 80

Entstellungen bei sehr ausgeprägten Formen sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

**9.3 Hypertonie (Bluthochdruck)**

leichte Form  
keine oder geringe Leistungsbeeinträchtigung  
(höchstens leichte Augenhintergrundveränderungen) ..... 0 – 10

mittelschwere Form  
mit Organbeteiligung leichten bis mittleren Grades  
(Augenhintergrundveränderungen – Fundus hypertonicus I – II –  
und/oder Linkshypertrophie des Herzens und/oder Proteinurie),  
diastolischer Blutdruck mehrfach über 100 mm Hg trotz Behandlung,  
je nach Leistungsbeeinträchtigung ..... 20 – 40

schwere Form  
mit Beteiligung mehrerer Organe (schwere Augenhintergrund-  
veränderungen und Beeinträchtigung der Herzfunktion, der  
Nierenfunktion und/oder der Hirndurchblutung) je nach Art  
und Ausmaß der Leistungsbeeinträchtigung ..... 50 – 100

maligne Form  
diastolischer Blutdruck konstant über 130 mm Hg;  
Fundus hypertonicus III – IV (Papillenödem, Venenstauung,  
Exsudate, Blutungen, schwerste arterielle Gefäßveränderungen);  
unter Einschluss der Organbeteiligung (Herz, Nieren, Gehirn) ..... 100

Funktionelle kardiovaskuläre Syndrome, (z.B. orthostatische Fehlregulation)

mit leichten Beschwerden ..... 0

mit stärkeren Beschwerden und Kollapsneigung ..... 10 – 20

**10. Verdauungsorgane**

**10.1 Speiseröhrenkrankheiten**

Traktionsdivertikel

je nach Größe und Beschwerden ..... 0 – 10

Pulsionsdivertikel

ohne wesentliche Behinderung der Nahrungsaufnahme je  
nach Größe und Beschwerden ..... 0 – 10

mit erheblicher Behinderung der Nahrungsaufnahme je  
nach Auswirkung auf den Allgemeinzustand ..... 20 – 40

Funktionelle Stenosen der Speiseröhre (Ösophagospasmus, Achalasie)

ohne wesentliche Behinderung der Nahrungsaufnahme ..... 0 – 10

mit deutlicher Behinderung der Nahrungsaufnahme .....	20 – 40
mit erheblicher Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes, häufige Aspiration .....	50 – 70
Auswirkungen auf Nachbarorgane (z.B. durch Aspiration) sind zusätzlich zu bewerten.	
<b>Organische Stenose der Speiseröhre</b>	
(z.B. angeboren, nach Laugenverätzung, Narbenstenose, peptische Striktur)	
ohne wesentliche Behinderung der Nahrungsaufnahme je nach Größe und Beschwerden .....	0 – 10
mit deutlicher Behinderung der Nahrungsaufnahme je nach Auswirkung (Einschränkung der Kostform, verlängerte Essdauer) .....	20 – 40
mit erheblicher Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes .....	50 – 70
<b>Refluxkrankheit der Speiseröhre</b>	
mit anhaltenden Refluxbeschwerden je nach Ausmaß .....	10 – 30
Auswirkungen auf Nachbarorgane sind zusätzlich zu bewerten.	
Nach Entfernung eines malignen Speiseröhrentumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten. GdS während dieser Zeit	
je nach Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes .....	80 – 100
<b>Speiseröhrenersatz</b>	
Der GdS ist nach den Auswirkungen (z.B. Schluckstörungen, Reflux, Narben) jedoch nicht unter 20 zu bewerten.	

## 10.2 Magen- und Darmkrankheiten

Bei organischen und funktionellen Krankheiten des Magen-Darmkanals ist der GdS nach dem Grad der Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes, der Schwere der Organstörung und nach der Notwendigkeit besonderer Diätkost zu beurteilen. Bei allergisch bedingten Krankheiten ist auch die Vermeidbarkeit der Allergene von Bedeutung.

### 10.2.1 Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwürsleiden (chronisch rezidivierende Geschwüre, Intervallbeschwerden)

mit Rezidiven in Abständen von zwei bis drei Jahren .....	0 – 10
---	--------

## GdS-Tabelle

mit häufigeren Rezidiven und Beeinträchtigung des Ernährungs- und Kräftezustandes .....	20 – 30
mit erheblichen Komplikationen (z.B. Magenausgangsstenose) und andauernder erheblicher Minderung des Ernährungs- und Kräftezustandes .....	40 – 50

Nach einer selektiven proximalen Vagotomie kommt ein GdS nur in Betracht, wenn postoperative Darmstörungen oder noch Auswirkungen des Grundleidens vorliegen.

Chronische Gastritis (histologisch gesicherte Veränderung der Magenschleimhaut) .....	0 – 10
Reizmagen (funktionelle Dyspepsie) .....	0 – 10
Teilentfernung des Magens, Gastroenterostomie mit guter Funktion, je nach Beschwerden .....	0 – 10
mit anhaltenden Beschwerden (z.B. Dumping-Syndrom, rezidivierendes Ulcus jejuni pepticum) .....	20 – 40

## Totalentfernung des Magens

ohne Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes je nach Beschwerden .....	20 – 30
bei Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes und/oder Komplikationen (z.B. Dumping-Syndrom) .....	40 – 50

Nach Entfernung eines malignen Magentumors ist eine Heilungsbewahrung abzuwarten.

GdS während einer Heilungsbewahrung von zwei Jahren nach Entfernung eines Magenfrühkarzinoms .....	50
GdS während einer Heilungsbewahrung von fünf Jahren nach Entfernung aller anderen malignen Magentumoren je nach Stadium und Auswirkung auf den Allgemeinzustand .....	80 – 100

### 10.2.2 Chronische Darmstörungen (irritabler Darm, Divertikulose, Divertikulitis, Darmteilresektion)

ohne wesentliche Beschwerden und Auswirkungen .....	0 – 10
mit stärkeren und häufig rezidivierenden oder anhaltenden Symptomen (z.B. Durchfälle, Spasmen) .....	20 – 30
mit erheblicher Minderung des Kräfte- und Ernährungszustandes .....	40 – 50

Angeborene Motilitätsstörungen des Darmes (z.B. Hirschsprung-Krankheit, neuronale Dysplasie)

ohne wesentliche Gedeih- und Entwicklungsstörung .....	10 – 20
mit geringer Gedeih- und Entwicklungsstörung .....	30 – 40
mit mittelgradiger Gedeih- und Entwicklungsstörung .....	50
mit schwerer Gedeih- und Entwicklungsstörung .....	60 – 70

Kurzdarmsyndrom im Kindesalter

mit mittelschwerer Gedeih- und Entwicklungsstörung .....	50 – 60
mit schwerer Gedeih- und Entwicklungsstörung (z.B. Notwendigkeit künstlicher Ernährung) .....	70 – 100

Colitis ulcerosa, Crohn-Krankheit (Enteritis regionalis)

mit geringer Auswirkung (geringe Beschwerden, keine oder geringe Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes, selten Durchfälle) .....	10 – 20
mit mittelschwerer Auswirkung (häufig rezidivierende oder länger anhaltende Beschwerden, geringe bis mittelschwere Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes, häufiger Durchfälle) .....	30 – 40
mit schwerer Auswirkung (anhaltende oder häufig rezidivierende erhebliche Beschwerden, erhebliche Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes, häufige, tägliche, auch nächtliche Durchfälle) .....	50 – 60
mit schwerster Auswirkung (häufig rezidivierende oder anhaltende schwere Beschwerden, schwere Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes, ausgeprägte Anämie) .....	70 – 80

Fisteln, Stenosen, postoperative Folgezustände (z.B. Kurzdarmsyndrom, Stomakomplikationen), extraintestinale Manifestationen (z.B. Arthritiden), bei Kindern auch Wachstums- und Entwicklungsstörungen, sind zusätzlich zu bewerten.

Zöliakie, Sprue

ohne wesentliche Folgeerscheinungen unter diätetischer Therapie .....	20
bei andauerndem, ungenügendem Ansprechen auf glutenfreie Kost (selten) sind – je nach Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustands – höhere Werte angemessen.	



GdS-Tabelle

Nach Entfernung maligner Darmtumoren ist eine Heilungsbewährung abzuwarten.

GdS während einer Heilungsbewährung von zwei Jahren

- nach Entfernung eines malignen Darmtumors im Stadium (T1 bis T2)  
N0 M0 oder von lokalisierten Darmkarzinoiden ..... 50
- mit künstlichem After (nicht nur vorübergehend  
angelegt)..... 70 – 80

GdS während einer Heilungsbewährung von fünf Jahren

- nach Entfernung anderer maligner Darmtumoren..... wenigstens 80
- mit künstlichem After (nicht nur vorübergehend angelegt)..... 100

**10.2.3 Bauchfellverwachsungen**

- ohne wesentliche Auswirkung ..... 0 – 10
- mit erheblichen Passagestörungen ..... 20 – 30
- mit häufiger rezidivierenden Ileuserscheinungen ..... 40 – 50

**10.2.4 Hämorrhoiden**

- ohne erhebliche Beschwerden, geringe Blutungsneigung ..... 0 – 10
- mit häufigen rezidivierenden Entzündungen, Thrombosierungen  
oder stärkeren Blutungen..... 20

Mastdarmvorfall

- klein, reponierbar ..... 0 – 10
- sonst ..... 20 – 40

Afterschließmuskelschwäche

- mit seltenem, nur unter besonderen Belastungen  
auftretendem, unwillkürlichem Stuhlabgang ..... 10
- sonst ..... 20 – 40

Funktionsverlust des Afterschließmuskels..... wenigstens 50

Fistel in der Umgebung des Afters

- geringe, nicht ständige Sekretion ..... 10
- sonst ..... 20 – 30

Künstlicher After

mit guter Versorgungsmöglichkeit.....	50
sonst (z.B. bei Bauchwandhernie, Stenose, Retraktion, Prolaps, Narben, ungünstige Position) .....	60 – 80

Bei ausgedehntem Mastdarmvorfall, künstlichem After oder stark sezernierenden Kotfisteln, die zu starker Verschmutzung führen, sind ggf. außergewöhnliche seelische Begleiterscheinungen zusätzlich zu berücksichtigen.

**10.3 Krankheiten der Leber, Gallenwege und Bauchspeicheldrüse**

Der GdS für Krankheiten der Leber, der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse wird bestimmt durch die Art und Schwere der Organveränderungen sowie der Funktionseinbußen, durch das Ausmaß der Beschwerden, die Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes und die Notwendigkeit einer besonderen Kostform. Der serologische Nachweis von Antikörpern als Nachweis einer durchgemachten Infektion (Seronarbe) rechtfertigt allein noch keinen GdS.

**10.3.1 Chronische Hepatitis**

Unter dem Begriff „chronische Hepatitis“ werden alle chronischen Verlaufsformen von Hepatitiden zusammengefasst (früher: „chronische Hepatitis ohne Progression“ <chronisch-persistierende Hepatitis> und „chronische Hepatitis mit Progression“ <chronisch aktive Hepatitis>). Dazu gehören insbesondere die Virus-, die Autoimmun-, die Arzneimittel- und die kryptogene Hepatitis.

Die gutachtliche Beurteilung einer chronischen Hepatitis beruht auf dem klinischen Befund einschließlich funktionsrelevanter Laborparameter, auf der Ätiologie sowie auf dem histopathologischen Nachweis des Grades der nekro-inflammatorischen Aktivität (Grading) und des Stadiums der Fibrose (Staging). Zusätzlich sind engmaschige Verlaufskontrollen und die Beachtung der Differentialdiagnose erforderlich. Dies gilt auch für geltend gemachte Verschlimmerungen im Leidensverlauf. Der GdS und die Leidensbezeichnung ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle, wobei bereits übliche Befindlichkeitsstörungen – nicht aber extrahepatische Manifestationen – berücksichtigt sind.

Chronische Hepatitis

ohne (klinisch-) entzündliche Aktivität .....	20
ehemals: chronische Hepatitis ohne Progression	
mit geringer (klinisch-) entzündlicher Aktivität .....	30
ehemals: chronische Hepatitis mit Progression, gering entzündliche Aktivität	
mit mäßiger (klinisch-) entzündlicher Aktivität .....	40
ehemals: chronische Hepatitis mit Progression, mäßig entzündliche Aktivität	

## GdS-Tabelle

- mit starker (klinisch-) entzündlicher Aktivität  
ehemals: chronische Hepatitis mit Progression, stark entzündliche Aktivität  
je nach Funktionsstörung ..... 50 – 70
- Alleinige Virus-Replikation („gesunder Virusträger“) ..... 10  
bei Hepatitis-C-Virus nur nach histologischem Ausschluss einer Hepatitis.

Bei Vorliegen eines histologischen Befundes gelten für die Virus-Hepatitisden folgende Besonderheiten:

Die histopathologische Bewertung der chronischen Virushepatitis umfasst die nekroinflammatorische Aktivität (Grading) und den Grad der Fibrose (Staging). Der GdS ergibt sich aus folgender Tabelle, wobei die genannten GdS-Werte die üblichen klinischen Auswirkungen mit umfassen.

Nekro-inflammatorische Aktivität	Fibrose		
	null-gering	mäßig	stark
gering	20	20	30
mäßig	30	40	40
stark	50	60	70

### Anmerkung:

Die Auswertung des histologischen Befundes soll sich an dem modifizierten histologischen Aktivitätsindex (HAI) ausrichten. Eine geringe nekro-inflammatorische Aktivität entspricht einer Punktzahl von 1 bis 5, eine mäßige nekro-inflammatorische Aktivität einer Punktzahl von 6 bis 10 und eine starke nekro-inflammatorische Aktivität einer Punktzahl von 11 bis 18. Eine fehlende bzw. geringe Fibrose entspricht einer Punktzahl 0 bis 2, eine mäßige Fibrose der Punktzahl 3 und eine starke Fibrose einer Punktzahl von 4 bis 5.

Für die Virushepatitis C gelten bei fehlender Histologie im Hinblick auf die chemischen Laborparameter folgende Besonderheiten:

ALAT-/GPT-Werte im Referenzbereich entsprechen bei nachgewiesener Hepatitis-C-Virus-Replikation einer chronischen Hepatitis ohne (klinisch-) entzündliche Aktivität.

ALAT-/GPT-Werte bis zum 3-fachen der oberen Grenze des Referenzbereichs entsprechen einer geringen (klinisch-) entzündlichen Aktivität.

ALAT-/GPT-Werte vom 3-fachen bis zum 6-fachen der oberen Grenze des Referenzbereichs entsprechen einer mäßigen (klinisch-) entzündlichen Aktivität.

ALAT-/GPT-Werte von mehr als dem 6-fachen der oberen Grenze des Referenzbereichs entsprechen einer starken (klinisch-) entzündlichen Aktivität.

Diese Bewertungen sind nur zulässig, wenn sie sich in das klinische Gesamtbild des bisherigen Verlaufs einfügen.

**10.3.2 Fibrose der Leber ohne Komplikationen ..... 0 – 10**

Leberzirrhose

    kompensiert

        inaktiv ..... 30

        gering aktiv ..... 40

        stärker aktiv ..... 50

    dekompensiert (Aszites, portale Stauung,  
    hepatische Enzephalopathie) ..... 60 – 100

**10.3.3 Fettleber (auch nutritiv-toxisch) ohne Mesenchymreaktion ..... 0 – 10**

Toxischer Leberschaden

    Der GdS ist je nach Aktivität und Verlauf analog zur chronischen Hepatitis oder Leberzirrhose zu beurteilen.

Zirkulatorische Störungen der Leber (z.B. Pfortaderthrombose)

    Der GdS ist analog zur dekompensierten Leberzirrhose zu beurteilen.

Nach Leberteilektomie ist der GdS allein davon abhängig, ob und wie weit Funktionsbeeinträchtigungen verblieben sind.

**10.3.4 Nach Entfernung eines malignen primären Lebertumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten; GdS während dieser Zeit ..... 100**

    Nach Lebertransplantation ist eine Heilungsbewährung abzuwarten (im Allgemeinen zwei Jahre); GdS während dieser Zeit ..... 100

    Danach selbst bei günstigem Heilungsverlauf unter Berücksichtigung der erforderlichen Immunsuppression ..... wenigstens 60

**10.3.5 Primäre biliäre Zirrhose, primäre sklerosierende Cholangitis**

    GdS ist je nach Aktivität und Verlauf analog zur chronischen Hepatitis oder Leberzirrhose zu beurteilen.

GdS-Tabelle

Gallenblasen- und Gallenwegskrankheiten

(Steinleiden, chronisch rezidivierende Entzündungen)

mit Koliken in Abständen von mehreren Monaten,  
Entzündungen in Abständen von Jahren ..... 0 – 10

mit häufigeren Koliken und Entzündungen sowie mit  
Intervallbeschwerden ..... 20 – 30

mit langanhaltenden Entzündungen oder mit  
Komplikationen ..... 40 – 50

Angeborene intra- und extrahepatische Transportstörungen der  
Galle (z.B. intra-, extrahepatische Gallengangsatriesie), metabolische  
Defekte (z.B. Meulengracht-Krankheit)

ohne Funktionsstörungen, ohne Beschwerden ..... 0 – 10

mit Beschwerden (Koliken, Fettunverträglichkeit, Juckreiz),

ohne Leberzirrhose ..... 20 – 40

mit Leberzirrhose ..... 50

mit dekompensierter Leberzirrhose ..... 60 – 100

Folgezustände sind zusätzlich zu bewerten.

Verlust der Gallenblase

ohne wesentliche Störungen ..... 0

bei fortbestehenden Beschwerden wie bei Gallenwegskrankheiten

Nach Entfernung eines malignen Gallenblasen-, Gallenwegs-  
oder Papillentumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungs-  
bewährung abzuwarten; GdS während dieser Zeit

bei Gallenblasen- und Gallenwegstumor ..... 100

bei Papillentumor ..... 80

**10.3.6 Chronische Krankheit der Bauchspeicheldrüse (exkretorische Funktion)  
je nach Auswirkung auf den Allgemeinzustand, Häufigkeit und Ausmaß der  
Schmerzen**

ohne wesentlichen Beschwerden, keine Beeinträchtigung  
des Kräfte- und Ernährungszustandes ..... 0 – 10

geringe bis erhebliche Beschwerden, geringe bis mäßige  
Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes ..... 20 – 40

starke Beschwerden, Fettstühle, deutliche bis ausgeprägte Herabsetzung des Kräfte- und Ernährungszustandes..... 50 – 80

Nach teilweiser oder vollständiger Entfernung der Bauchspeicheldrüse sind ggf. weitere Funktionsbeeinträchtigungen (z.B. bei Diabetes mellitus, Osteopathie, oder infolge chronischer Entzündungen der Gallenwege, Magenteilentfernung und Milzverlust) zusätzlich zu berücksichtigen.

Nach Entfernung eines malignen Bauchspeicheldrüsentumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten; GdS während dieser Zeit 100.

**11 11. Brüche (Hernien)**

**11.1 Leisten- oder Schenkelbruch je nach Größe und Reponierbarkeit**

ein- oder beidseitig ..... 0 – 10  
 bei erheblicher Einschränkung der Belastungsfähigkeit..... 20

**11.2 Nabelbruch oder Bruch in der weißen Linie ..... 0 – 10**

Bauchnarbenbruch, angeborene Bauchwandbrüche und -defekte

ohne wesentliche Beeinträchtigung, je nach Größe..... 0 – 10  
 mit ausgedehnter Bauchwandschwäche und fehlender oder stark eingeschränkter Bauchpresse ..... 20  
 mit Beeinträchtigung der Bauchorgane bei Passagestörungen ohne erhebliche Komplikationen ..... 20 – 30  
 bei häufigen rezidivierenden Ileuserscheinungen ..... 40 – 50

Bei schweren angeborenen Bauchwanddefekten mit entsprechender Beeinträchtigung der Bauch- und Brustorgane kommt auch ein höherer GdS in Betracht.

**11.3 Zwerchfellbrüche (einschl. Zwerchfellrelaxation)**

Speiseröhrengleithernie ..... 0 – 10  
 andere kleine Zwerchfellbrüche ohne wesentliche Funktionsstörung ..... 0 – 10  
 größere Zwerchfellbrüche je nach Funktionsstörung ..... 20 – 30  
 Komplikationen sind zusätzlich zu bewerten.

Angeborene Zwerchfelldefekte mit Verlagerung von inneren Organen in den Brustkorb und Minderentwicklung von Lungengewebe

- mit geringer Einschränkung der Lungenfunktion..... 40
- sonst je nach Funktionsbeeinträchtigung der betroffenen Organe ..... 50 – 100

## 12. Harnorgane

12

Die Beurteilung des GdS bei Schäden der Harnorgane richtet sich nach dem Ausmaß der Störungen der inkretorischen und exkretorischen Nierenfunktion und/oder des Harntransportes, was durch spezielle Untersuchungen zu erfassen ist.

Daneben sind die Beteiligung anderer Organe (z.B. Herz/Kreislauf, Zentralnervensystem, Skelettsystem), die Aktivität eines Entzündungsprozesses, die Auswirkungen auf den Allgemeinzustand und die notwendige Beschränkung in der Lebensführung zu berücksichtigen.

Unter dem im Folgenden verwendeten Begriff „Funktionseinschränkung der Nieren“ ist die Retention harnpflichtiger Substanzen zu verstehen.

### 12.1 Nierenschäden

#### 12.1.1 Verlust, Ausfall oder Fehlen einer Niere bei Gesundheit der anderen Niere ..... 25

Verlust, Ausfall oder Fehlen einer Niere bei Schaden der anderen Niere, ohne Einschränkung der Nierenfunktion, mit krankhaftem Harnbefund..... 30

Nierenfehlbildung (z.B. Erweiterung des Nierenhohlsystems bei Ureterabgangsstenose, Nierenhypoplasie, Zystennieren, Nierenzysten, Beckenniere), Nephroptose

- ohne wesentliche Beschwerden und ohne Funktionseinschränkung ..... 0 – 10

- mit wesentlichen Beschwerden und ohne Funktionseinschränkung ..... 20 – 30

Nierensteinleiden ohne Funktionseinschränkung der Niere

- mit Koliken in Abständen von mehreren Monaten..... 0 – 10

- mit häufigeren Koliken, Intervallbeschwerden und wiederholten Harnwegsinfekten ..... 20 – 30

Nierenschäden ohne Einschränkung der Nierenfunktion  
(z.B. Glomerulopathien, tubulointerstitielle Nephropathien, vaskuläre Nephropathien), ohne Beschwerden, mit krankhaftem Harnbefund (Eiweiß und/oder Erythrozyten- bzw. Leukozytenausscheidung)..... 0 – 10

**12.1.2 Nierenschäden ohne Einschränkung der Nierenfunktion, mit Beschwerden rezidivierende Makrohämaturie, je nach Häufigkeit..... 10 – 30**

Nephrotisches Syndrom

- kompensiert (keine Ödeme)..... 20 – 30
- dekompensiert (mit Ödemen) ..... 40 – 50
- bei Systemerkrankungen mit Notwendigkeit einer immunsuppressiven Behandlung ..... 50

**12.1.3 Nierenschäden mit Einschränkung der Nierenfunktion**

Eine geringfügige Einschränkung der Kreatininclearance auf 50 – 80 ml/min bei im Normbereich liegenden Serumkreatininwerten bedingt keinen messbaren GdS.

Nierenfunktionseinschränkung

- leichten Grades  
    (Serumkreatininwerte unter 2 mg/dl [Kreatininclearance ca. 35 – 50 ml/min], Allgemeinbefinden nicht oder nicht wesentlich reduziert, keine Einschränkung der Leistungsfähigkeit). ..... 20 – 30
- (Serumkreatininwerte andauernd zwischen 2 und 4 mg/dl erhöht, Allgemeinbefinden wenig reduziert, leichte Einschränkung der Leistungsfähigkeit)..... 40
- mittleren Grades  
    (Serumkreatininwerte andauernd zwischen 4 und 8 mg/dl erhöht, Allgemeinbefinden stärker beeinträchtigt, mäßige Einschränkung der Leistungsfähigkeit) ..... 50 – 70
- schweren Grades  
    (Serumkreatininwerte dauernd über 8 mg/dl, Allgemeinbefinden stark gestört, starke Einschränkung der Leistungsfähigkeit, bei Kindern keine normalen Schulleistungen mehr). ..... 80 – 100

Verlust, Ausfall oder Fehlen einer Niere mit Funktionseinschränkung der anderen Niere

- leichten Grades ..... 40 – 50
- mittleren Grades ..... 60 – 80
- schweren Grades ..... 90 – 100



## GdS-Tabelle

Notwendigkeit der Dauerbehandlung mit Blutreinigungsverfahren  
(z.B. Hämodialyse, Peritonealdialyse) ..... 100

Bei allen Nierenschäden mit Funktionseinschränkungen sind Sekundärleiden  
(z.B. Hypertonie, ausgeprägte Anämie [Hb-Wert unter 8 g/dl], Polyneuropathie,  
Osteopathie) zusätzlich zu bewerten.

**12.1.4 Nach Nierentransplantation ist eine Heilungsbewährung abzuwarten  
(im Allgemeinen zwei Jahre); während dieser Zeit ist ein GdS von 100 anzusetzen.  
Danach ist der GdS entscheidend abhängig von der verbliebenen Funktions-  
störung; unter Mitberücksichtigung der erforderlichen Immunsuppression ist  
jedoch der GdS nicht niedriger als 50 zu bewerten.**

Nach Entfernung eines malignen Nierentumors oder Nierenbeckentumors ist eine  
Heilungsbewährung abzuwarten.

GdS während einer Heilungsbewährung von zwei Jahren

nach Entfernung eines Nierenzellkarzinoms (Hypernephrom)  
im Stadium T1 N0 M0 (Grading G1) ..... 50

nach Entfernung eines Nierenbeckentumors im Stadium  
Ta N0 M0 (Grading G1) ..... 50

GdS während einer Heilungsbewährung von fünf Jahren nach  
Entfernung eines Nierenzellkarzinoms (Hypernephrom)

im Stadium (T1 [Grading ab G2], T2) N0 M0 ..... 60

in höheren Stadien ..... wenigstens 80

nach Entfernung eines Nierenbeckentumors

im Stadium (T1 bis T2) N0 M0 ..... 60

in höheren Stadien ..... wenigstens 80

nach Entfernung eines Nephroblastoms

im Stadium I und II ..... 60

in höheren Stadien ..... wenigstens 80

## 12.2 Schäden der Harnwege

### 12.2.1 Chronische Harnwegsentzündungen (insbesondere chronische Harnblase-entzündung)

leichten Grades (ohne wesentliche Miktionsstörungen) ..... 0 – 10

stärkeren Grades

(mit erheblichen und häufigen Miktionsstörungen) ..... 20 – 40

chronische Harnblasenentzündung mit Schrumpfbhase  
(Fassungsvermögen unter 100 ml, Blasenentmesmen)..... 50 – 70

**12.2.2 Bei Entleerungsstörungen der Blase (auch durch Harnröhrenverengung) sind Begleiterscheinungen (z.B. Hautschäden, Harnwegsentzündungen) ggf. zusätzlich zu bewerten.**

Entleerungsstörungen der Blase

leichten Grades  
(z.B. geringe Restharnbildung, längeres Nachträufeln)..... 10

stärkeren Grades  
(z.B. Notwendigkeit manueller Entleerung, Anwendung eines Blasenschrittmachers, erhebliche Restharnbildung, schmerzhaftes Harnlassen) ..... 20 – 40

mit Notwendigkeit regelmäßigen Katheterisierens, eines Dauerkatheters, eines suprapubischen Blasenfistelkatheters oder Notwendigkeit eines Urinals, ohne wesentliche Begleiterscheinungen..... 50

**12.2.3 Nach Entfernung eines malignen Blasentumors ist eine Heilungsbewährung abzuwarten.**

GdS während einer Heilungsbewährung von zwei Jahren

nach Entfernung des Tumors im Frühstadium unter Belastung der Harnblase (Ta bis T1) N0 M0, Grading G1..... 50

GdS während einer Heilungsbewährung von fünf Jahren

nach Entfernung im Stadium Tis oder T1 (Grading ab G2)..... 50

nach Entfernung in den Stadien (T2 bis T3a) N0 M0..... 60

mit Blasenentfernung einschließlich künstlicher Harnableitung..... 80

nach Entfernung in höheren Stadien..... 100

**12.2.4 Harninkontinenz**

relative

leichter Harnabgang bei Belastung (z.B. Stressinkontinenz Grad I)..... 0 – 10

Harnabgang tags und nachts (z.B. Stressinkontinenz Grad II – III)..... 20 – 40

völlige Harninkontinenz ..... 50

bei ungünstiger Versorgungsmöglichkeit..... 60 – 70

nach Implantation einer Sphinkterprothese mit guter Funktion .....	20
Harnröhren-Hautfistel der vorderen Harnröhre bei Harnkontinenz .....	10
Harnweg-Darmfistel bei Analkontinenz, je nach Luft- und Stuhlentleerung über die Harnröhre .....	30 – 50
Künstliche Harnableitung (ohne Nierenfunktionsstörung) in den Darm .....	30
nach außen	
mit guter Versorgungsmöglichkeit .....	50
sonst (z.B. bei Stenose, Retraktion, Abdichtungsproblemen) .....	60 – 80
Darmneoblase mit ausreichendem Fassungsvermögen, ohne Harnstau, ohne wesentliche Entleerungsstörungen .....	30

## 13. Männliche Geschlechtsorgane

13

### 13.1 Verlust des Penis .....

50

#### Teilverlust des Penis

Teilverlust der Eichel .....	10
Verlust der Eichel .....	20
Sonst .....	30 – 40

Nach Entfernung eines malignen Penistumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten; GdS während dieser Zeit nach Entfernung im Frühstadium (T1 bis T2) N0 M0

bei Teilverlust des Penis .....	50
bei Verlust des Penis .....	60
mit vollständiger Entfernung der Corpora cavernosa .....	80
nach Entfernung in höheren Stadien .....	90 – 100

### 13.2 Unterentwicklung, Verlust oder Schwund eines Hodens bei intaktem anderen Hoden .....

0

#### Unterentwicklung, Verlust oder vollständiger Schwund beider Hoden

in höherem Lebensalter (etwa ab 8. Lebensjahrzehnt) .....	10
sonst je nach Ausgleichbarkeit des Hormonhaushalts durch Substitution .....	20 – 30

vor Abschluss der körperlichen Entwicklung .....	20 – 40
Verlust oder Schwund eines Nebenhodens .....	0
Verlust oder vollständiger Schwund beider Nebenhoden und/oder Zeugungsunfähigkeit (Impotentia generandi) .....	0
in jüngerem Lebensalter bei noch bestehendem Kinderwunsch .....	20
Impotentia coeundi bei nachgewiesener erfolgloser Behandlung .....	20

**13.3 Hydrozele (sog. Wasserbruch) ..... 0 – 10**

Varikozele (sog. Krampfaderbruch) .....	0 – 10
---	--------

**13.4 Nach Entfernung eines malignen Hodentumors ist eine Heilungsbewährung abzuwarten.**

GdS während einer Heilungsbewährung von zwei Jahren

nach Entfernung eines Seminoms oder nichtseminomatösen Tumors im Stadium (T1 bis T2) N0 M0 .....	50
---	----

GdS während einer Heilungsbewährung von fünf Jahren

nach Entfernung eines Seminoms im Stadium (T1 bis T2) N1 M0 bzw. T3 N0 M0 .....	50
--	----

nach Entfernung eines nichtseminomatösen Tumors im Stadium (T1 bis T2) N1 M0 bzw. T3 N0 M0 .....	60
---	----

in höheren Stadien .....	80
--------------------------	----

**13.5 Chronische bakterielle Entzündung der Vorsteherdrüse oder abakterielle Prostatopathie**

ohne wesentliche Miktionsstörung .....	0 – 10
--	--------

mit andauernden Miktionsstörungen und Schmerzen .....	20
---	----

Prostataadenom

Der GdS richtet sich nach den Harnentleerungsstörungen und der Rückwirkung auf die Nierenfunktion.

**13.6 Nach Entfernung eines malignen Prostatatumors ist eine Heilungsbewährung abzuwarten.**

GdS während einer Heilungsbewährung von zwei Jahren

nach Entfernung im Stadium T1a N0 M0 (Grading G1) .....	50
---	----

GdS-Tabelle

GdS während einer Heilungsbewährung von fünf Jahren

nach Entfernung in den Stadien T1a N0 M0 (Grading ab G2) und (T1b bis T2) N0 M0 .....	50
nach Entfernung in höheren Stadien .....	wenigstens 80

Maligner Prostatatumor

ohne Notwendigkeit einer Behandlung .....	50
auf Dauer hormonbehandelt .....	wenigstens 60

## 14. Weibliche Geschlechtsorgane

14

### 14.1 Verlust der Brust (Mastektomie)

einseitig .....	30
beidseitig .....	40
Segment- oder Quadrantenresektion der Brust .....	0 – 20

Funktionseinschränkungen im Schultergürtel, des Armes oder der Wirbelsäule als Operations- oder Bestrahlungsfolgen (z.B. Lymphödem, Muskeldefekte, Nervenläsionen, Fehlhaltung) sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Aufbauplastik zur Wiederherstellung der Brust mit Prothese je nach Ergebnis (z.B. Kapselfibrose, Dislokation der Prothese, Symmetrie)

nach Mastektomie	
einseitig .....	10 – 30
beidseitig .....	20 – 40
nach subkutaner Mastektomie	
einseitig .....	10 – 20
beidseitig .....	20 – 30

Nach Aufbauplastik zur Wiederherstellung der Brust mit Eigengewebe kommt ein geringerer GdS in Betracht.

Nach Entfernung eines malignen Brustdrüsentumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten.

GdS während dieser Zeit

bei Entfernung im Stadium (T1 bis T2) pN0 M0 .....	50
--	----

bei Entfernung im Stadium (T1 bis T2) pN1 M0 .....	60
in höheren Stadien .....	wenigstens 80
Bedingen die Folgen der Operation und gegebenenfalls anderer Behandlungsmaßnahmen einen GdS von 50 oder mehr, ist der während der Heilungsbewährung anzusetzende GdS entsprechend höher zu bewerten.	
Nach Entfernung eines Carcinoma in situ der Brustdrüse ist in den ersten zwei Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten. Der GdS beträgt während dieser Zeit 50.	
<b>14.2 Verlust der Gebärmutter und/oder Sterilität .....</b>	<b>0</b>
in jüngerem Lebensalter bei noch bestehendem Kinderwunsch .....	20
Nach Entfernung eines malignen Gebärmuttertumors ist eine Heilungsbewährung abzuwarten.	
GdS während einer Heilungsbewährung von zwei Jahren	
nach Entfernung eines Zervixtumors (Mikrokarzinom) im Stadium T1a N0 M0 .....	50
nach Entfernung eines Korpustumors im Frühstadium (Grading G1, Infiltration höchstens des inneren Drittels des Myometrium) .....	50
GdS während einer Heilungsbewährung von fünf Jahren nach Entfernung eines Zervixtumors	
im Stadium (T1b bis T2a) N0 M0 .....	50
im Stadium T2b N0 M0 .....	60
in höheren Stadien .....	80
nach Entfernung eines Korpustumors	
im Stadium T1 N0 M0 (Grading ab G2, Infiltration über das innere Drittel des Myometrium hinaus) .....	50
im Stadium T2 N0 M0 .....	60
in höheren Stadien .....	80
<b>14.3 Verlust eines Eierstockes .....</b>	<b>0</b>
Unterentwicklung, Verlust oder Ausfall beider Eierstöcke,	
ohne Kinderwunsch und ohne wesentliche Auswirkung auf den Hormonhaushalt – immer in der Postmenopause .....	10

im jüngeren Lebensalter bei noch bestehendem Kinderwunsch oder bei unzureichender Ausgleichbarkeit des Hormonausfalls durch Substitution .....	20 – 30
vor Abschluss der körperlichen Entwicklung je nach Ausgleichbarkeit des Hormonausfalls .....	20 – 40

Endokrin bedingte Funktionsstörungen der Eierstöcke sind gut behandelbar, so dass im Allgemeinen anhaltende Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind. Selten auftretende Komplikationen (z.B. Sterilität, abnormer Haarwuchs) sind gesondert zu beurteilen.

Nach Entfernung eines malignen Eierstocktumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten; GdS während dieser Zeit

nach Entfernung im Stadium T1 N0 M0 .....	50
in anderen Stadien .....	80

**14.4 Chronischer oder chronisch-rezidivierender entzündlicher Prozess der Adnexe und/oder der Parametrien je nach Art, Umfang und Kombination der Auswirkungen (z.B. Adhäsionsbeschwerden, chronische Schmerzen, Kohabitationsbeschwerden) .....** 10 – 40

#### 14.5 Endometriose

leichten Grades (geringe Ausdehnung, keine oder nur geringe Beschwerden) .....	0 – 10
mittleren Grades .....	20 – 40
schweren Grades (z.B. Übergreifen auf die Nachbarorgane, starke Beschwerden, erhebliche Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes, Sterilität) .....	50 – 60

#### 14.6 Scheidenfisteln

Harnweg-Scheidenfistel .....	50 – 60
Mastdarm-Scheidenfistel .....	60 – 70
Harnweg-Mastdarm-Scheidenfistel (Kloakenbildung) .....	100

Fisteln mit geringer funktioneller Beeinträchtigung sind entsprechend niedriger zu bewerten.

Senkung der Scheidenwand, Vorfall der Scheide und/oder der Gebärmutter	
ohne Harninkontinenz oder mit geringer Stressinkontinenz (Grad I) .....	0 – 10
mit stärkerer Harninkontinenz und/oder stärkeren Senkungs- beschwerden.....	20 – 40
mit völliger Harninkontinenz.....	50 – 60
bei ungünstiger Versorgungsmöglichkeit.....	70
Ulzerationen sind ggf. zusätzlich zu bewerten.	
Isolierte Senkung der Scheidenhinterwand mit leichten Defäkationsstörungen.....	
	0 – 10
Scheiden-Gebärmutteraplasie, ohne Plastik, nach Vollendung des 14. Lebensjahres (einschließlich Sterilität) .....	
	40
Kraurosis vulvae	
geringen Grades (keine oder nur geringen Beschwerden) .....	0 – 10
mäßigen Grades (erhebliche Beschwerden, keine Sekundärveränderungen) .....	20 – 30
stärkeren Grades (starke Beschwerden, therapeutisch schwer beeinflussbare Sekundärveränderungen) .....	40
Vollständige Entfernung der Vulva.....	
	40
Nach Beseitigung eines malignen Scheidentumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten; GdS während dieser Zeit	
nach Beseitigung im Stadium T1 N0 M0.....	60
in höheren Stadien.....	80
Nach Entfernung eines malignen Tumors der äußeren Geschlechtsteile ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten; GdS während dieser Zeit	
nach Entfernung im Stadium (T1 bis T2) N0 M0.....	50
sonst .....	80

## 15. Stoffwechsel, innere Sekretion

In diesem Abschnitt nicht erwähnte angeborene Stoffwechselstörungen sind analog und unter Berücksichtigung ihrer vielfältigen Auswirkungen zu beurteilen. Normabweichungen der Laborwerte bedingen für sich allein noch keinen GdS.



**15.1 Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)**

Die an Diabetes erkrankten Menschen, deren Therapie regelhaft keine Hypoglykämie auslösen kann und die somit in der Lebensführung kaum beeinträchtigt sind, erleiden auch durch den Therapieaufwand keine Teilhabebeeinträchtigung, die die Feststellung eines GdS rechtfertigt. Der GdS beträgt 0.

Die an Diabetes erkrankten Menschen, deren Therapie eine Hypoglykämie auslösen kann und die durch Einschnitte in der Lebensführung beeinträchtigt sind, erleiden durch den Therapieaufwand eine signifikante Teilhabebeeinträchtigung. Der GdS beträgt 20.

Die an Diabetes erkrankten Menschen, deren Therapie eine Hypoglykämie auslösen kann, die mindestens einmal täglich eine dokumentierte Überprüfung des Blutzuckers selbst durchführen müssen und durch weitere Einschnitte in der Lebensführung beeinträchtigt sind, erleiden je nach Ausmaß des Therapieaufwands und der Güte der Stoffwechseleinstellung eine stärkere Teilhabebeeinträchtigung. Der GdS beträgt 30 bis 40.

Die an Diabetes erkrankten Menschen, die eine Insulintherapie mit täglich mindestens vier Insulininjektionen durchführen, wobei die Insulindosis in Abhängigkeit vom aktuellen Blutzucker, der folgenden Mahlzeit und der körperlichen Belastung selbständig variiert werden muss, und durch erhebliche Einschnitte gravierend in der Lebensführung beeinträchtigt sind, erleiden auf Grund dieses Therapieaufwands eine ausgeprägte Teilhabebeeinträchtigung. Die Blutzuckerselbstmessungen und Insulindosen (beziehungsweise Insulingaben über die Insulinpumpe) müssen dokumentiert sein. Der GdS beträgt 50.

Außergewöhnlich schwer regulierbare Stoffwechsellagen können jeweils höhere GdS-Werte bedingen.

**15.2 Gicht**

Bei der Beurteilung des GdS sind die Funktionseinschränkungen der betroffenen Gelenke, Schmerzen, Häufigkeit und Schwere der entzündlichen Schübe und eine Beteiligung der inneren Organe zu berücksichtigen.

**15.3 Fettstoffwechselkrankheit**

Der GdS ist grundsätzlich abhängig von dem Ausmaß der Folgekrankheiten.

Bei Notwendigkeit einer LDL-Apherese ..... 30

Alimentäre Fettsucht, Adipositas

Die Adipositas allein bedingt keinen GdS. Nur Folge- und Begleitschäden (insbesondere am kardiopulmonalen System oder am Stütz- und Bewegungs-

apparat) können die Annahme eines GdS begründen. Gleiches gilt für die besonderen funktionellen Auswirkungen einer Adipositas permagna.

**15.4 Phenylketonurie**

ohne fassbare Folgeerscheinungen

im Kindesalter bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres ..... 30

danach bei Notwendigkeit weiterer Diäteeinnahme ..... 10

Beim Vorliegen eines Hirnschadens ist der GdS vor allem vom Ausmaß der geistigen Behinderung und weiterer Folgen (z.B. hirnorganische Anfälle) abhängig.

**15.5 Mukoviszidose (zystische Fibrose)**

unter Therapie Aktivitäten, Gedeihen und Ernährung altersgemäß. .... 20

unter Therapie Aktivitäten und Lungenfunktion leicht eingeschränkt,  
Gedeihen und Ernährung noch altersgemäß ..... 30 – 40

Aktivitäten und Lungenfunktion deutlich eingeschränkt,  
häufig Gedeih- und Entwicklungsstörungen, Schulbesuch und  
Erwerbstätigkeit in der Regel noch möglich ..... 50 – 70

schwere bis schwerste Einschränkung der Aktivitäten, der  
Lungenfunktion und des Ernährungszustandes ..... 80 – 100

Folgekrankheiten (z.B. Diabetes mellitus, Impotenz, Leberzirrhose)  
sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

**15.6 Schilddrüsenerkrankheiten**

Schilddrüsenfunktionsstörungen sind gut behandelbar, so dass in der Regel anhaltende Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind. Selten auftretende Organkomplikationen (z.B. Exophthalmus, Trachealstenose) sind gesondert zu beurteilen. Bei der nicht operativ behandelten Struma richtet sich der GdS nach den funktionellen Auswirkungen.

Nach Entfernung eines malignen Schilddrüsentumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten; GdS während dieser Zeit

nach Entfernung eines papillären oder follikulären Tumors,  
ohne Lymphknotenbefall ..... 50

sonst ..... 80

Bedingt der nach der Entfernung verbliebene Organschaden einen GdS von 50 oder mehr, ist der während der Heilungsbewährung anzusetzende GdS entsprechend höher zu bewerten.

GdS-Tabelle

Tetanie

Sie ist gut behandelbar, so dass in der Regel dauernde Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind.

**15.7 Chronische Nebennierenrindeninsuffizienz (Addison-Syndrom)**

Sie ist gut behandelbar, so dass in der Regel dauernde Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind. Selten auftretende Funktionsstörungen sind analogen funktionellen Beeinträchtigungen (z.B. orthostatische Fehlregulation) entsprechend zu beurteilen.

Cushing-Syndrom

Der GdS wird bestimmt von der Muskelschwäche und den Auswirkungen an den verschiedenen Organsystemen (Hypertonie, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus, Osteoporose, psychische Veränderungen).

**15.8 Porphyrien**

Erythroetische Porphyrie (Günther-Krankheit) .....	100
Hepatische Porphyrien	
akut-intermittierende Porphyrie .....	30
Porphyria cutanea tarda ohne wesentliche Beschwerden .....	10

Organkomplikationen sind jeweils zusätzlich zu berücksichtigen.

**16. Blut, blutbildende Organe, Immunsystem**

16

Die Höhe des GdS bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems richtet sich nach der Schwere der hämatologischen Veränderungen, nach den Organfunktionsstörungen, nach den Rückwirkungen auf andere Organe, nach der Auswirkung auf den Allgemeinzustand und der Häufigkeit von Infektionen.

**16.1 Verlust der Milz**

bei Verlust im frühen Kindesalter, dann bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres .....	20
danach oder bei späterem Verlust .....	10

**16.2 Hodgkin-Krankheit**

im Stadium I bis IIIA	
bei mehr als sechs Monate andauernder Therapie, bis zum Ende der Intensiv-Therapie je nach Auswirkung auf den Allgemeinzustand .....	60 – 100
nach Vollremission GdS für die Dauer von drei Jahren (Heilungsbewährung).....	50
im Stadium IIIB und IV	
bis zum Ende der Intensiv-Therapie .....	100
nach Vollremission GdS für die Dauer von drei Jahren (Heilungsbewährung) .....	60

**16.3 Non-Hodgkin-Lymphome**

**16.3.1 Chronische lymphatische Leukämie und andere generalisierte niedrigmaligne Non-Hodgkin-Lymphome**

mit geringen Auswirkungen (keine wesentlichen Beschwerden, keine Allgemeinsymptome, keine Behandlungsbedürftigkeit, keine wesentliche Progredienz) .....	30 – 40
mit mäßigen Auswirkungen (Behandlungsbedürftigkeit).....	50 – 70
mit starken Auswirkungen, starke Progredienz (z.B. schwere Anämie, ausgeprägte Thrombozytopenie, rezidivierende Infektionen, starke Milzvergrößerung) .....	80 – 100

**Lokalisierte niedrigmaligne Non-Hodgkin-Lymphome**

nach Vollremission (Beseitigung des Tumors) für die Dauer von drei Jahren (Heilungsbewährung).....	50
--	----

**16.3.2 Hochmaligne Non-Hodgkin-Lymphome**

bis zum Ende der Intensiv-Therapie .....	100
nach Vollremission GdS für die Dauer von drei Jahren (Heilungsbewährung) .....	80

**16.4 Plasmozytom (Myelom)**

mit geringen Auswirkungen (keine wesentliche Auswirkung auf den Allgemeinzustand, keine Behandlungsbedürftigkeit, ohne Beschwerden, keine wesentliche Progredienz).....	30 – 40
---	---------

## GdS-Tabelle

mit mäßigen Auswirkungen (Behandlungsbedürftigkeit).....	50 – 70
mit starken Auswirkungen (z.B. schwere Anämie, starke Schmerzen, Nierenfunktions- einschränkung) .....	80 – 100

**16.5 Myeloproliferative und myelodysplastische/myeloproliferative Neoplasien**

Auswirkungen auf andere Organsysteme sind zusätzlich zu bewerten.

**16.5.1 Chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-positiv**

Im Stadium der kompletten hämatologischen, kompletten zytogenetischen und molekularen Remission beträgt der GdS .....	10 – 20
Im Stadium der kompletten hämatologischen Remission je nach Ausmaß der zytogenetischen Remission beträgt der GdS .....	30 – 40
Im chronischen Stadium, auch bei Krankheitsbeginn (im ersten Jahr der Therapie), bei fehlender Remission oder bei Rezidiv je nach Organvergrößerung, Anämie, Thrombozytenzahl und in Abhängigkeit von der Intensität der Therapie beträgt der GdS .....	50 – 80
In der akzelerierten Phase oder in der Blastenkrise beträgt der GdS.....	100

**16.5.2 Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ;  
chronische Neutrophilen-Leukämie; chronische myelomonozytäre Leukämie**

Im Stadium der kompletten hämatologischen Remission beträgt der GdS.....	40
Im chronischen Stadium, auch bei Krankheitsbeginn (im ersten Jahr der Therapie), ist die Teilhabebeeinträchtigung insbesondere abhängig vom Ausmaß der Organvergrößerung und Anämie, der Thrombozytenzahl und der Intensität der Therapie. Der GdS beträgt .....	50 – 80
In der akzelerierten Phase oder in der Blastenkrise beträgt der GdS.....	100

**16.5.3 Primäre Myelofibrose (Chronische idiopathische Myelofibrose)**

Bei geringen Auswirkungen (keine Behandlungsbedürftigkeit) beträgt der GdS.....	10 – 20
Bei mäßigen Auswirkungen (Behandlungsbedürftigkeit) beträgt der GdS.....	30 – 40

Bei stärkeren Auswirkungen (insbesondere mäßige Anämie, geringe Thrombozytopenie, ausgeprägte Organomegalie) beträgt der GdS.....	50 – 70
Bei starken Auswirkungen (insbesondere schwere Anämie, ausgeprägte Thrombozytopenie, exzessive Organomegalie) beträgt der GdS.....	80 – 100

### 16.5.4 Chronische Eosinophilen-Leukämie/Hypereosinophilie-Syndrom

Die Teilhabebeeinträchtigung ist insbesondere abhängig vom Ausmaß der Organomegalie, Hautbeteiligung, Blutbildveränderungen und Nebenwirkungen der Therapie. Der GdS beträgt mindestens 50.

### 16.5.5 Polycythaemia vera

Bei Behandlungsbedürftigkeit

mit regelmäßigen Aderlässen. Der GdS beträgt .....	10
mit zytoreduktiver Therapie ist die Teilhabebeeinträchtigung insbesondere abhängig vom Ausmaß der Nebenwirkungen der Therapie. Der GdS beträgt .....	30 – 40

Übergänge zu anderen myeloproliferativen Erkrankungen sind analog zu diesen zu bewerten.

### 16.5.6 Essentielle Thrombozythämie

Bei Behandlungsbedürftigkeit

- mit Thrombozytenaggregationshemmern. Der GdS beträgt .....
- mit zytoreduktiver Therapie ist die Teilhabebeeinträchtigung insbesondere abhängig vom Ausmaß der Nebenwirkungen der Therapie. Der GdS beträgt .....

Übergänge zu anderen myeloproliferativen Erkrankungen sind analog zu diesen zu bewerten.

### 16.5.7 Die juvenile myelomonozytäre Leukämie ist analog zur akuten myeloiden Leukämie zu bewerten.

### 16.6 Akute Leukämien

Im ersten Jahr nach Diagnosestellung (Erstdiagnose oder Rezidiv; insbesondere während der Induktionstherapie, Konsolidierungstherapie, Erhaltungstherapie) beträgt der GdS .....

## GdS-Tabelle

Nach dem ersten Jahr

- bei unvollständiger klinischer Remission: Der GdS beträgt weiterhin ..... 100
- bei kompletter klinischer Remission unabhängig von der durchgeführten Therapie: Der GdS beträgt ..... 80 für die Dauer von drei Jahren (Heilungsbewährung).

Danach ist der GdS nach den verbliebenen Auswirkungen (insbesondere chronische Müdigkeit, Sterilität, Neuropathien, Beeinträchtigung der Entwicklung und kognitiver Funktionen) zu bewerten.

### 16.7 Myelodysplastische Syndrome

mit geringen Auswirkungen (ausgeglichen und ohne wesentliche Allgemeinstörungen) .....	10 – 20
mit mäßigen Auswirkungen (z.B. gelegentliche Transfusionen) .....	30 – 40
mit stärkeren Auswirkungen (z.B. andauernde Transfusionsbedürftigkeit, rezidivierende Infektionen) .....	50 – 80
mit starken Auswirkungen (z.B. andauernde Transfusionsbedürftigkeit, häufige Infektionen, Blutungsneigung, leukämische Transformation) .....	100

Aplastische Anämie (auch Panmyelopathie), Agranulozytose

Der GdS bei aplastischer Anämie oder Agranulozytose ist auch nach Therapie analog zu den myelodysplastischen Syndromen zu bewerten.

### 16.8 Knochenmark- und Stammzelltransplantation

Nach autologer Knochenmark- oder Blutstammzelltransplantation ist der GdS entsprechend der Grundkrankheit zu beurteilen.

Nach allogener Knochenmarktransplantation für die Dauer von drei Jahren (Heilungsbewährung)..... 100

Danach ist der GdS nach den verbliebenen Auswirkungen und dem eventuellen Organschaden, jedoch nicht niedriger als 30, zu bewerten.

### 16.9 Anämien

Symptomatische Anämien (z.B. Eisenmangelanämie, vitaminabhängige Anämien) sind in der Regel gut behandelbar und nur vorübergehender Natur.

Therapierefraktäre Anämien (z.B. bestimmte hämolytische Anämien, Thalassämie, Erythrozytenenzymdefekte)

mit geringen Auswirkungen (ausgeglichen und ohne wesentliche Allgemeinstörungen) .....	0 – 10
mit mäßigen Auswirkungen (z.B. gelegentliche Transfusionen) .....	20 – 40
mit starken Auswirkungen (z.B. andauernde Transfusionsbedürftigkeit).....	50 – 70

**16.10 Hämophilie und entsprechende plasmatische Blutungskrankheiten (je nach Blutungsneigung)**

leichte Form	
mit Restaktivität von antihämphilem Globulin (AHG) über 5 % .....	20
mittelschwere Form – mit 1-5 % AHG	
mit seltenen Blutungen.....	30 – 40
mit häufigen (mehrfach jährlich) ausgeprägten Blutungen .....	50 – 80
schwere Form – mit weniger als 1 % AHG .....	80 – 100
Sonstige Blutungsleiden	
ohne wesentliche Auswirkungen .....	10
mit mäßigen Auswirkungen.....	20 – 40
mit starken Auswirkungen (starke Blutungen bereits bei leichten Traumen).....	50 – 70
mit ständiger klinisch manifester Blutungsneigung (Spontanblutungen, Gefahr lebensbedrohlicher Blutungen) .....	80 – 100

Eine Behandlung mit Antikoagulantien ist bei der Grundkrankheit (z.B. bei Herzklappen- und Gefäßprothesen, Thrombophilie) berücksichtigt. Wenn die Grundkrankheit nicht mehr besteht bzw. keinen GdS mehr bedingt, aber eine Weiterbehandlung mit Antikoagulantien erforderlich ist, kann – analog den sonstigen Blutungsleiden – in der Regel ein GdS von 10 angenommen werden.

**16.11 Immundefekte**

Angeborene Defekte der humoralen und zellulären Abwehr (z.B. Adenosinaminase-Defekt, DiGeorge-Syndrom, permanente B-Zell-Defekte, septische Granulomatose)

ohne klinische Symptomatik .....	0
trotz Therapie erhöhte Infektanfälligkeit, aber keine außergewöhnlichen Infektionen .....	20 – 40
trotz Therapie neben erhöhter Infektanfälligkeit auch außergewöhnliche Infektionen (ein bis zwei pro Jahr) .....	50



Bei schwereren Verlaufsformen kommt ein höherer GdS in Betracht.

#### Erworbenes Immundefizienzsyndrom (HIV-Infektion)

HIV-Infektion ohne klinische Symptomatik .....	10
HIV-Infektion mit klinischer Symptomatik geringe Leistungsbeeinträchtigung (z.B. bei Lymphadenop- athiesyndrom [LAS]) .....	30 – 40
stärkere Leistungsbeeinträchtigung (z.B. bei AIDS-related complex [ARC]) .....	50 – 80
schwere Leistungsbeeinträchtigung (AIDS-Vollbild) .....	100

## 17. Haut

17

Bei der Beurteilung des GdS von Hautkrankheiten sind Art, Ausdehnung, Sitz, Auswirkungen auf den Allgemeinzustand, Begleiterscheinungen (wie Jucken, Nässen, Brennen, unangenehme und abstoßende Gerüche) und die Rezidivbereitschaft bzw. die Chronizität sowie die Notwendigkeit wiederholter stationärer Behandlung zu berücksichtigen. Bei Hautkrankheiten mit stark schwankendem Leidensverlauf kommt ein Durchschnitts-GdS in Betracht. Bei Kindern können sich Hautkrankheiten schwerer auswirken als bei Erwachsenen.

Narben können durch Ausdehnung, Beschaffenheit (z.B. Verhärtung, Verdünnung, Narbenzüge), Sitz oder Einwirkung auf ihre Umgebung zu Störungen führen. Bei flächenhaften Narben nach Verbrennungen, Verätzungen und ähnlichem muss außerdem die Beeinträchtigung der Haut als Schutz-, Ausscheidungs- und Sinnesorgan berücksichtigt werden. Diese Störungen bestimmen die Höhe des GdS.

Bei Entstellungen ist zu berücksichtigen, dass sich Schwierigkeiten im Erwerbsleben, Unannehmlichkeiten im Verkehr mit fremden Menschen sowie seelische Konflikte ergeben können.

### 17.1 Ekzeme

#### Kontaktexzeme (z.B. irritatives und allergisches Kontaktexzem)

geringe Ausdehnung und bis zu zweimal im Jahr für wenige Wochen auftretend .....	0 – 10
sonst .....	20 – 30

#### Atopisches Ekzem („Neurodermitis constitutionalis“, „endogenes Ekzem“)

geringe, auf die Prädispositionsstellen begrenzte Ausdehnung bis zu zweimal im Jahr für wenige Wochen auftretend .....	0 – 10
bei länger dauerndem Bestehen .....	20 – 30

mit generalisierten Hauterscheinungen, insbesondere Gesichtsbefall .....	40
mit klinischer oder vergleichbar intensiver ambulanter Behandlungsnotwendigkeit mehrmals im Jahr .....	50

### Seborrhoisches Ekzem

geringe Ausdehnung und Beschränkung auf die Prädilektionsstellen .....	0 – 10
sonst, je nach Ausdehnung .....	20 – 30

### 17.2 Chronisch rezidivierende Urtikaria/Quincke-Ödem

selten, bis zu zweimal im Jahr auftretend, leicht vermeidbare Noxen oder Allergene .....	0 – 10
häufiger auftretende Schübe, schwer vermeidbare Noxen oder Allergene .....	20 – 30
schwerer chronischer, über Jahre sich hinziehender Verlauf .....	40 – 50
Eine systemische Beteiligung z.B. des Gastrointestinaltraktes oder des Kreislaufs ist ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.	

### 17.3 Akne

#### Acne vulgaris

leichteren bis mittleren Grades .....	0 – 10
schweren Grades mit vereinzelter Abszess- und Knotenbildung und entsprechender erheblicher kosmetischer Beeinträchtigung .....	20 – 30

#### Acne conglobata

auf die Prädilektionsstellen begrenzte häufige Abszess- und Fistelbildungen und lokalisationsbedingte Beeinträchtigungen .....	30 – 40
schwerste Formen mit rezidivierenden eitrig-vernarbenden axilläringuinalen und nuchalen Abszessen (Acne triade) und ggf. zusätzlicher Beteiligung des Pilonidalsinus (Acne tetraade) .....	wenigstens 50

### 17.4 Rosazea, Rhinophym

geringe Ausdehnung, kosmetisch nur wenig störend .....	0 – 10
stärkere Ausdehnung, entstellende Wirkung .....	20 – 30

### 17.5 Hautveränderungen bei Autoimmunkrankheiten des Bindegewebes (z.B. Lupus erythematoses, Dermatomyositis, progressive systemische Sklerodermie)

auf die Prädilektionsstellen begrenzt bei geringer Ausdehnung ..... 0 – 10

auf die Prädilektionsstellen begrenzt bei stärkerer Ausdehnung, je nach kosmetischer und funktioneller Auswirkung ..... 20 – 40

über die Prädilektionsstellen hinausgehend, ggf. Ulzerationen ..... 50 – 70

### 17.6 Blasenbildende Hautkrankheiten (z.B. Pemphigus, Pemphigoide)

bei begrenztem Haut- und Schleimhautbefall mit geringer Ausdehnung ..... 10

sonst ..... 20 – 40

bei generalisiertem Haut- und Schleimhautbefall ..... 50 – 80

in fortgeschrittenen Stadien bei schwerer Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes auch höher.

### 17.7 Psoriasis vulgaris

auf die Prädilektionsstellen beschränkt ..... 0 – 10

ausgedehnter, aber erscheinungsfreie Intervalle von Monaten ..... 20

bei andauerndem ausgedehnten Befall oder stark beeinträchtigendem lokalen Befall (z.B. an den Händen) ..... 30 – 50

Eine außergewöhnliche Nagelbeteiligung (mit Zerstörung der Nagelplatten) sowie eine Gelenk- und Wirbelsäulenbeteiligung sind zusätzlich zu bewerten.

### 17.8 Erythrodermien

bei leichter Intensität des Krankheitsprozesses ..... 40

bei mittlerer Intensität des Krankheitsprozesses ohne wesentliche Auswirkung auf den Allgemeinzustand ..... 50 – 60

mit stärkerer Auswirkung auf den Allgemeinzustand ..... 70 – 80

### 17.9 Ichthyosis

leichte Form,  
auf Stamm und Extremitäten weitgehend begrenzt, mit trockener Haut, mäßiger Schuppung, ohne wesentliche Verfärbung ..... 0 – 10

mittlere Form auf Stamm und Extremitäten weitgehend begrenzt, mit stärkerer Schuppung und Verfärbung .....	20 – 40
schwere Form mit ausgeprägter Schuppung und Verfärbung der gesamten Haut, insbesondere der Gelenkbeugen und des Gesichts .....	50 – 80

## 17.10 Mykosen

bei begrenztem Hautbefall .....	0 – 10
bei Befall aller Finger- und Fußnägel, ggf. mit Zerstörung von Nagelplatten .....	20
Chronisch rezidivierendes Erysipel	
ohne bleibendes Lymphödem .....	10
sonst, je nach Ausprägung des Lymphödems .....	20 – 40
Chronisch rezidivierender Herpes simplex	
geringe Ausdehnung, bis zu dreimal im Jahr rezidivierend .....	0 – 10
größere Ausdehnung, häufiger rezidivierend .....	20

## 17.11 Totaler Haarausfall

(mit Fehlen von Augenbrauen und Wimpern) .....	30
--	----

## 17.12 Naevus

Der GdS richtet sich allein nach dem Ausmaß einer eventuellen Entstellung.

Pigmentstörungen (z.B. Vitiligo)	
an Händen und/oder Gesicht	
gering .....	10
ausgedehnter .....	20
sonst .....	0

## 17.13 Nach Entfernung eines malignen Tumors der Haut ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten (Ausnahmen: z.B. Basalzellkarzinome, Bowen-Krankheit, Melanoma in situ); GdS während dieser Zeit

nach Entfernung eines Melanoms im Stadium I ([pT1 bis T2] pN0 M0) oder eines anderen Hauttumors in den Stadien (pT1 bis T2) pN0 bis N2 M0 .....	50
in anderen Stadien .....	80

## 18. Haltungs- und Bewegungsorgane, rheumatische Krankheiten

18

### 18.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt umfasst Haltungsschäden, degenerative Veränderungen, osteopenische Krankheiten, posttraumatische Zustände, chronische Osteomyelitis, entzündlich-rheumatische Krankheiten, Kollagenosen und Vaskulitiden sowie nichtentzündliche Krankheiten der Weichteile.

Der GdS für angeborene und erworbene Schäden an den Haltungs- und Bewegungsorganen wird entscheidend bestimmt durch die Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen (Bewegungsbehinderung, Minderbelastbarkeit) und die Mitbeteiligung anderer Organsysteme. Die üblicher Weise auftretenden Beschwerden sind dabei mitberücksichtigt.

Außergewöhnliche Schmerzen sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen. Schmerzhaftige Bewegungseinschränkungen der Gelenke können schwerwiegender als eine Versteifung sein.

Bei Haltungsschäden und/oder degenerativen Veränderungen an Gliedmaßen-gelenken und an der Wirbelsäule (z.B. Arthrose, Osteochondrose) sind auch Gelenkschwellungen, muskuläre Verspannungen, Kontrakturen oder Atrophien zu berücksichtigen.

Mit Bild gebenden Verfahren festgestellte Veränderungen (z.B. degenerativer Art) allein rechtfertigen noch nicht die Annahme eines GdS. Ebenso kann die Tatsache, dass eine Operation an einer Gliedmaße oder an der Wirbelsäule (z.B. Meniskusoperation, Bandscheibenoperation, Synovialektomie) durchgeführt wurde, für sich allein nicht die Annahme eines GdS begründen.

Das Funktionsausmaß der Gelenke wird im Folgenden nach der Neutral-Null-Methode angegeben.

Fremdkörper beeinträchtigen die Funktion nicht, wenn sie in Muskel oder Knochen reaktionslos eingeheilt sind und durch ihre Lage keinen ungünstigen Einfluss auf Gelenke, Nerven oder Gefäße ausüben.

Der GdS bei Weichteilverletzungen richtet sich nach der Funktionseinbuße und der Beeinträchtigung des Blut- und Lymphgefäßsystems. Bei Fasziaverletzungen können Muskelbrüche auftreten, die nur in seltenen Fällen einen GdS bedingen.

Bei den entzündlich-rheumatischen Krankheiten sind unter Beachtung der Krankheitsentwicklung neben der strukturellen und funktionellen Einbuße die Aktivität mit ihren Auswirkungen auf den Allgemeinzustand und die Beteiligung weiterer Organe zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt für Kollagenosen und Vaskulitiden.

Bei ausgeprägten osteopenischen Krankheiten (z.B. Osteoporose, Osteopenie bei hormonellen Störungen, gastrointestinalen Resorptionsstörungen, Nierenschäden) ist der GdS vor allem von der Funktionsbeeinträchtigung und den Schmerzen abhängig. Eine ausschließlich messtechnisch nachgewiesene Minderung des Knochenmineralgehalts rechtfertigt noch nicht die Annahme eines GdS.

**18.2 Entzündlich-rheumatische Krankheiten**

**18.2.1 Entzündlich-rheumatische Krankheiten der Gelenke und/oder der Wirbelsäule (z.B. Bechterew-Krankheit)**

ohne wesentliche Funktionseinschränkung mit leichten Beschwerden .....	10
mit geringen Auswirkungen (leichtgradige Funktionseinbußen und Beschwerden, je nach Art und Umfang des Gelenkbefalls, geringe Krankheitsaktivität) .....	20 – 40
mit mittelgradigen Auswirkungen (dauernde erhebliche Funktionseinbußen und Beschwerden, therapeutisch schwer beeinflussbare Krankheitsaktivität) .....	50 – 70
mit schweren Auswirkungen (irreversible Funktionseinbußen, hochgradige Progredienz) .....	80 – 100
Auswirkungen über sechs Monate anhaltender aggressiver Therapien sind gegebenenfalls zusätzlich zu berücksichtigen.	

**18.2.2 Kollagenosen (z.B. systemischer Lupus erythematoses, progressiv-systemische Sklerose, Polymyositis/Dermatomyositis),**

**18.2.3 Vaskulitiden (z.B. Panarteriitis nodosa, Polymyalgia rheumatica)**

Die Beurteilung des GdS bei Kollagenosen und Vaskulitiden richtet sich nach Art und Ausmaß der jeweiligen Organbeteiligung sowie den Auswirkungen auf den Allgemeinzustand, wobei auch eine Analogie zu den Muskelkrankheiten in Betracht kommen kann. Für die Dauer einer über sechs Monate anhaltenden aggressiven Therapie soll ein GdS von 50 nicht unterschritten werden.

**18.3 Bei der Beurteilung nicht-entzündlicher Krankheiten der Weichteile kommt es auf Art und Ausmaß der jeweiligen Organbeteiligung sowie auf die Auswirkungen auf den Allgemeinzustand an.**

### 18.4 Fibromyalgie

Die Fibromyalgie, das Chronische Fatigue Syndrom (CFS), die Multiple Chemical Sensitivity (MCS) und ähnliche Syndrome sind jeweils im Einzelfall entsprechend der funktionellen Auswirkungen analog zu beurteilen.

### 18.5 Chronische Osteomyelitis

Bei der Beurteilung des GdS sind die aus der Lokalisation und Ausdehnung des Prozesses sich ergebende Funktionsstörung, die dem Prozess innewohnende Aktivität und ihre Auswirkungen auf den Allgemeinzustand und außerdem etwaige Folgekrankheiten (z.B. Anämie, Amyloidose) zu berücksichtigen. Bei ausgeprägt schubförmigem Verlauf ist ein Durchschnitts-GdS zu bilden.

Ruhende Osteomyelitis (Inaktivität wenigstens 5 Jahre) ..... 0 – 10

Chronische Osteomyelitis

geringen Grades  
(eng begrenzt, mit geringer Aktivität, geringe Fisteleiterung) ... mindestens 20

mittleren Grades  
(ausgedehnter Prozess, häufige oder ständige Fisteleiterung,  
Aktivitätszeichen auch in Laborbefunden) ..... mindestens 50

schweren Grades  
(häufige schwere Schübe mit Fieber, ausgeprägter Infiltration  
der Weichteile, Eiterung und Sequesterabstoßung, erhebliche  
Aktivitätszeichen in den Laborbefunden) ..... mindestens 70

Eine wesentliche Besserung wegen Beruhigung des Prozesses kann erst angenommen werden, wenn nach einem Leidensverlauf von mehreren Jahren seit wenigstens zwei Jahren – nach jahrzehntelangem Verlauf seit fünf Jahren – keine Fistel mehr bestanden hat und auch aus den weiteren Befunden (einschließlich Röntgenbildern und Laborbefunden) keine Aktivitätszeichen mehr erkennbar gewesen sind. Dabei ist in der Regel der GdS nur um 20 bis 30 Punkte niedriger einzuschätzen und zwei bis vier Jahre lang noch eine weitere Heilungsbewährung abzuwarten, bis der GdS nur noch von dem verbliebenen Schaden bestimmt wird.

### 18.6 Muskelkrankheiten

Bei der Beurteilung des GdS ist von folgenden Funktionsbeeinträchtigungen auszugehen:

Muskelschwäche

mit geringen Auswirkungen (vorzeitige Ermüdung,  
gebrauchsabhängige Unsicherheiten) ..... 20 – 40

mit mittelgradigen Auswirkungen (zunehmende Gelenkkontrakturen und Deformitäten, Aufrichten aus dem Liegen nicht mehr möglich, Unmöglichkeit des Treppensteigens) ..... 50 – 80

mit schweren Auswirkungen (bis zur Geh- und Stehufähigkeit und Gebrauchsunfähigkeit der Arme) ..... 90 – 100

Zusätzlich sind bei einzelnen Muskelkrankheiten Auswirkungen auf innere Organe (z.B. Einschränkung der Lungenfunktion und/oder der Herzleistung durch Brustkorbdeformierung) oder Augenmuskel-, Schluck- oder Sprechstörungen (z.B. bei der Myasthenie) zu berücksichtigen.

## 18.7 Kleinwuchs

Körpergröße nach Abschluss des Wachstums

über 130 bis 140 cm ..... 30 – 40

über 120 bis 130 cm ..... 50

Bei 120 cm und darunter kommen entsprechend höhere Werte in Betracht.

Dieser GdS ist auf harmonischen Körperbau bezogen.

Zusätzlich zu berücksichtigen sind (z.B. bei Achondroplasie, bei Osteogenesis imperfecta) mit dem Kleinwuchs verbundene Störungen wie

mangelhafte Körperproportionen,

Verbildungen der Gliedmaßen,

Störungen der Gelenkfunktion, Muskelfunktion und Statik,

neurologische Störungen,

Einschränkungen der Sinnesorgane,

endokrine Ausfälle und

außergewöhnliche psychoreaktive Störungen.

## 18.8 Großwuchs

Großwuchs allein rechtfertigt noch nicht die Annahme eines GdS.

Auf psychoreaktive Störungen ist besonders zu achten.

## 18.9 Wirbelsäulenschäden

Der GdS bei angeborenen und erworbenen Wirbelsäulenschäden (einschließlich Bandscheibenschäden, Scheuermann-Krankheit, Spondylolisthesis, Spinalkanalstenose und dem sogenannten Postdiskotomiesyndrom) ergibt sich primär aus



## GdS-Tabelle

dem Ausmaß der Bewegungseinschränkung, der Wirbelsäulenverformung und -instabilität sowie aus der Anzahl der betroffenen Wirbelsäulenabschnitte.

Der Begriff Instabilität beinhaltet die abnorme Beweglichkeit zweier Wirbel gegeneinander unter physiologischer Belastung und die daraus resultierenden Weichteilveränderungen und Schmerzen. Sogenannte Wirbelsäulensyndrome (wie Schulter-Arm-Syndrom, Lumbalsyndrom, Ischialgie, sowie andere Nerven- und Muskelreizerscheinungen) können bei Instabilität und bei Einengungen des Spinalkanals oder der Zwischenwirbellöcher auftreten.

Für die Bewertung von chronisch-rezidivierenden Bandscheibensyndromen sind aussagekräftige anamnestiche Daten und klinische Untersuchungsbefunde über einen ausreichend langen Zeitraum von besonderer Bedeutung. Im beschwerdefreien Intervall können die objektiven Untersuchungsbefunde nur gering ausgeprägt sein.

## Wirbelsäulenschäden

ohne Bewegungseinschränkung oder Instabilität .....	0
mit geringen funktionellen Auswirkungen (Verformung, rezidivierende oder anhaltende Bewegungseinschränkung oder Instabilität geringen Grades, seltene und kurz dauernd auftretende leichte Wirbelsäulensyndrome) .....	10
mit mittelgradigen funktionellen Auswirkungen in einem Wirbelsäulenabschnitt (Verformung, häufig rezidivierende oder anhaltende Bewegungseinschränkung oder Instabilität mittleren Grades, häufig rezidivierende und über Tage andauernde Wirbelsäulensyndrome) .....	20
mit schweren funktionellen Auswirkungen in einem Wirbelsäulenabschnitt (Verformung, häufig rezidivierende oder anhaltende Bewegungseinschränkung oder Instabilität schweren Grades, häufig rezidivierende und Wochen andauernde ausgeprägte Wirbelsäulensyndrome) .....	30
mit mittelgradigen bis schweren funktionellen Auswirkungen in zwei Wirbelsäulenabschnitten .....	30 – 40
mit besonders schweren Auswirkungen (z.B. Versteifung großer Teile der Wirbelsäule; anhaltende Ruhigstellung durch Rumpforthese, die drei Wirbelsäulenabschnitte umfasst [z.B. Milwaukee-Korsett]; schwere Skoliose [ab ca. 70° nach Cobb]) .....	50 – 70

bei schwerster Belastungsinsuffizienz bis zur Geh- und Stehfähigkeit. .... 80 – 100

Anhaltende Funktionsstörungen infolge Wurzelkompression mit motorischen Ausfallerscheinungen – oder auch die intermittierenden Störungen bei der Spinalkanalstenose – sowie Auswirkungen auf die inneren Organe (z.B. Atemfunktionsstörungen) sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Bei außergewöhnlichen Schmerzsyndromen kann auch ohne nachweisbare neurologische Ausfallerscheinungen (z.B. Postdiskotomiesyndrom) ein GdS über 30 in Betracht kommen.

Das neurogene Hinken ist etwas günstiger als vergleichbare Einschränkungen des Gehvermögens bei arteriellen Verschlusskrankheiten zu bewerten.

### 18.10 Beckenschäden

- ohne funktionelle Auswirkungen ..... 0
- mit geringen funktionellen Auswirkungen (z.B. stabiler Beckenring, degenerative Veränderungen der Kreuz-Darmbeingelenke) ..... 10
- mit mittelgradigen funktionellen Auswirkungen (z.B. instabiler Beckenring einschließlich Sekundärarthrose). .... 20
- mit schweren funktionellen Auswirkungen und Deformierung ..... 30 – 40

### 18.11 Gliedmaßenschäden, Allgemeines

Der GdS bei Gliedmaßenschäden ergibt sich aus dem Vergleich mit dem GdS für entsprechende Gliedverluste. Trotz erhaltener Extremität kann der Zustand gelegentlich ungünstiger sein als der Verlust.

Die aufgeführten GdS für Gliedmaßenverluste gehen – soweit nicht anders erwähnt ist – von günstigen Verhältnissen des Stumpfes und der benachbarten Gelenke aus. Bei ausgesprochen ungünstigen Stumpfverhältnissen, bei nicht nur vorübergehenden Stumpfkrankheiten sowie bei nicht unwesentlicher Funktionsbeeinträchtigung des benachbarten Gelenkes sind diese Sätze im Allgemeinen um 10 zu erhöhen, unabhängig davon, ob Körperersatzstücke getragen werden oder nicht.

Körperersatzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel mindern bei Verlust und Funktionsstörungen der Gliedmaßen sowie bei Funktionseinschränkungen des Rumpfes die Auswirkungen der Behinderung, ohne dass dadurch der durch den Schaden allein bedingte GdS eine Änderung erfährt.

Bei der Bewertung des GdS von Pseudarthrosen ist zu berücksichtigen, dass straffe Pseudarthrosen günstiger sind als schlaffe.

GdS-Tabelle

Bei habituellen Luxationen richtet sich die Höhe des GdS außer nach der Funktionsbeeinträchtigung der Gliedmaße auch nach der Häufigkeit der Ausrenkungen.

**18.12 Endoprothesen**

Es werden Mindest-GdS angegeben, die für Endoprothesen bei bestmöglichem Behandlungsergebnis gelten. Bei eingeschränkter Versorgungsqualität sind höhere Werte angemessen.

Die Versorgungsqualität kann insbesondere beeinträchtigt sein durch

- Beweglichkeits- und Belastungseinschränkung,
- Nervenschädigung,
- deutliche Muskelminderung,
- ausgeprägte Narbenbildung.

Die in der GdS-Tabelle angegebenen Werte schließen die bei der jeweiligen Versorgungsart üblicherweise gebotenen Beschränkungen ein.

Hüftgelenk

bei einseitiger Endoprothese beträgt der GdS mindestens .....	10
bei beidseitiger Endoprothese beträgt der GdS mindestens .....	20

Kniegelenk

bei einseitiger Totalendoprothese beträgt der GdS mindestens .....	20
bei beidseitiger Totalendoprothese beträgt der GdS mindestens .....	30
bei einseitiger Teilendoprothese beträgt der GdS mindestens .....	10
bei beidseitiger Teilendoprothese beträgt der GdS mindestens .....	20

Oberes Sprunggelenk

bei einseitiger Endoprothese beträgt der GdS mindestens .....	10
bei beidseitiger Endoprothese beträgt der GdS mindestens .....	20

Schultergelenk

bei einseitiger Endoprothese beträgt der GdS mindestens .....	20
bei beidseitiger Endoprothese beträgt der GdS mindestens .....	40

Ellenbogengelenk

bei einseitiger Totalendoprothese beträgt der GdS mindestens .....	30
--	----

bei beidseitiger Totalendoprothese beträgt der GdS mindestens ..... 50

**Kleine Gelenke**

Endoprothesen bedingen keine wesentliche Teilhabebeeinträchtigung.

**Aseptische Nekrosen**

Hüftkopfnekrosen (z.B. Perthes-Krankheit)  
während der notwendigen Entlastung ..... 70

Lunatum-Malazie  
während der notwendigen Immobilisierung ..... 30

**18.13 Schäden der oberen Gliedmaßen**

**Extremitätenverlust**

Verlust beider Arme oder Hände ..... 100

Verlust eines Armes und Beines ..... 100

Verlust eines Armes im Schultergelenk oder  
mit sehr kurzem Oberarmstumpf ..... 80

Unter einem sehr kurzen Oberarmstumpf ist ein Stumpf zu verstehen,  
der eine gleiche Funktionseinbuße wie der Verlust des Armes im Schulter-  
gelenk zur Folge hat. Das ist immer dann der Fall, wenn die Absetzungsebene  
in Höhe des Collum chirurgicum liegt.

Verlust eines Armes im Oberarm oder im Ellenbogengelenk ..... 70

Verlust eines Armes im Unterarm ..... 50

Verlust eines Armes im Unterarm mit einer Stumpflänge bis 7 cm ..... 60

Verlust der ganzen Hand ..... 50

Versteifung des Schultergelenks in günstiger Stellung  
bei gut beweglichem Schultergürtel ..... 30

Eine Versteifung im Schultergelenk in einem Abspreizwinkel  
um ca. 45° und leichter Vorhalte gilt als funktionell günstig.

Versteifung des Schultergelenks in ungünstiger Stellung oder bei  
gestörter Beweglichkeit des Schultergürtels ..... 40 – 50

**Bewegungseinschränkung des Schultergelenks (einschließlich Schultergürtel)**

Armhebung nur bis zu 120° mit entsprechender Ein-  
schränkung der Dreh- und Spreizfähigkeit ..... 10

## GdS-Tabelle

Armhebung nur bis zu 90° mit entsprechender Einschränkung der Dreh- und Spreizfähigkeit .....	20
Instabilität des Schultergelenks	
geringen Grades, auch seltene Ausrenkung (in Abständen von 1 Jahr und mehr) .....	10
mittleren Grades, auch häufigere Ausrenkung .....	20 – 30
schweren Grades (auch Schlottergelenk), auch ständige Ausrenkung .....	40
Schlüsselbeinpseudarthrose	
straff .....	0 – 10
schlaff .....	20
Verkürzung des Armes bis zu 4 cm bei freier Beweglichkeit der großen Armgelenke .....	0
Oberarmpseudarthrose	
straff .....	20
schlaff .....	40
Riss der langen Bizepssehne .....	0 – 10
Versteifung des Ellenbogengelenks einschließlich Aufhebung der Unterarmdrehbewegung	
in günstiger Stellung .....	30
in ungünstiger Stellung .....	40 – 50
Die Versteifung in einem Winkel zwischen 80° und 100° bei mittlerer Pronations- stellung des Unterarms ist als günstige Gebrauchsstellung aufzufassen.	
Bewegungseinschränkung im Ellenbogengelenk	
geringen Grades (Streckung/Beugung bis 0-30-120 bei freier Unterarmdrehbeweglichkeit) .....	0 – 10
stärkeren Grades (insbesondere der Beugung einschließlich Einschränkung der Unterarmdrehbeweglichkeit) .....	20 – 30
Isolierte Aufhebung der Unterarmdrehbeweglichkeit	
in günstiger Stellung (mittlere Pronationsstellung) .....	10

in ungünstiger Stellung .....	20
in extremer Supinationsstellung .....	30
Ellenbogen-Schlottergelenk .....	40
Unterarmpseudarthrose	
straff .....	20
schlaff .....	40
Pseudarthrose der Elle oder Speiche .....	10 – 20
Versteifung des Handgelenks	
in günstiger Stellung (leichte Dorsalextension) .....	20
in ungünstiger Stellung .....	30
Bewegungseinschränkung des Handgelenks	
geringen Grades (z.B. Streckung/Beugung bis 30-0-40) .....	0 – 10
stärkeren Grades .....	20 – 30
Nicht oder mit Deformierung verheilte Brüche oder Luxationen der Handwurzelknochen oder eines oder mehrerer Mittelhandknochen mit sekundärer Funktionsbeeinträchtigung .....	10 – 30
Versteifung eines Daumengelenks in günstiger Stellung .....	0 – 10
Versteifung beider Daumengelenke und des Mittelhand-Handwurzelgelenks in günstiger Stellung .....	20
Versteifung eines Fingers in günstiger Stellung (mittlere Gebrauchsstellung) .....	0 – 10
Versteifungen der Finger in Streck- oder starker Beugstellung sind oft störender als ein glatter Verlust.	
Verlust des Daumenendgliedes .....	0
Verlust des Daumenendgliedes und des halben Grundgliedes .....	10
Verlust eines Daumens .....	25
Verlust beider Daumen .....	40
Verlust eines Daumens mit Mittelhandknochen .....	30
Verlust des Zeigefingers, Mittelfingers, Ringfingers oder Kleinfingers, auch mit Teilen des dazugehörigen Mittelhandknochens .....	10

## GdS-Tabelle

Verlust von zwei Fingern	
mit Einschluss des Daumens .....	30
II+III, II+IV .....	30
sonst .....	25
Verlust von drei Fingern	
mit Einschluss des Daumens .....	40
II+III+IV .....	40
sonst .....	30
Verlust von vier Fingern	
mit Einschluss des Daumens .....	50
sonst .....	40
Verlust der Finger II bis V an beiden Händen .....	80
Verlust aller fünf Finger einer Hand .....	50
Verlust aller zehn Finger .....	100
Obige Sätze gelten für den Gesamtverlust der Finger bei reizlosen Stumpfverhältnissen. Bei Verlust einzelner Fingerglieder sind sie herabzusetzen, bei schlechten Stumpfverhältnissen zu erhöhen.	
Fingerstümpfe im Mittel- und Endgelenk können schmerzhafte Narbenbildung und ungünstige Weichteildeckung zeigen. Empfindungsstörungen an den Fingern, besonders an Daumen und Zeigefinger, können die Gebrauchsfähigkeit der Hand wesentlich beeinträchtigen.	
Nervenausfälle (vollständig)	
Armplexus .....	80
oberer Armplexus .....	50
unterer Armplexus .....	60
N. axillaris .....	30
N. thoracicus longus .....	20
N. musculocutaneus .....	20
N. radialis	
ganzer Nerv .....	30

mittlerer Bereich oder distal .....	20
N. ulnaris	
proximal oder distal .....	30
N. medianus	
proximal .....	40
distal .....	30
Nn. radialis und axillaris .....	50
Nn. radialis und ulnaris .....	50
Nn. radialis und medianus .....	50
Nn. ulnaris und medianus .....	50
Nn. radialis, ulnaris und medianus im Vorderarmbereich .....	60

Trophische Störungen sind zusätzlich zu berücksichtigen; Teilausfälle der genannten Nerven sind entsprechend geringer zu bewerten.

### 18.14 Schäden der unteren Gliedmaßen

Verlust beider Beine im Oberschenkel .....	100
Verlust eines Beines im Oberschenkel und eines Beines im Unterschenkel .....	100
Verlust eines Beines und Armes .....	100
Verlust eines Beines im Hüftgelenk oder mit sehr kurzem Oberschenkelstumpf .....	80
Unter einem sehr kurzen Oberschenkelstumpf ist ein Stumpf zu verstehen, der eine gleiche Funktionseinbuße wie der Verlust des Beines im Hüftgelenk bedingt. Das ist immer dann der Fall, wenn die Absetzungsebene in Höhe des Trochanter minor liegt.	
Verlust eines Beines im Oberschenkel (einschließlich Absetzung nach Gritti) .....	70
Notwendigkeit der Entlastung des ganzen Beines (z.B. Sitzbeinabstützung) .....	70
Verlust eines Beines im Unterschenkel bei genügender Funktionstüchtigkeit des Stumpfes und der Gelenke .....	50
Notwendigkeit der Entlastung eines Unterschenkels (z.B. Schienbeinkopfabstützung) .....	50



## GdS-Tabelle

Verlust eines Beines im Unterschenkel bei ungenügender Funktionstüchtigkeit des Stumpfes und der Gelenke .....	60
Verlust beider Beine im Unterschenkel .....	80
bei einseitig ungünstigen Stumpfverhältnissen .....	90
bei beidseitig ungünstigen Stumpfverhältnissen .....	100
Teilverlust eines Fußes, Absetzung	
nach Pirogow	
einseitig, guter Stumpf .....	40
beidseitig .....	70
nach Chopart	
einseitig, guter Stumpf .....	30
einseitig, mit Fußfehlstellung .....	30 – 50
beidseitig .....	60
nach Lisfranc oder im Bereich der Mittelfußknochen nach Sharp	
einseitig, guter Stumpf .....	30
einseitig, mit Fußfehlstellung .....	30 – 40
beidseitig .....	50
Verlust einer Zehe .....	0
Verlust einer Großzehe .....	10
Verlust einer Großzehe mit Verlust des Köpfchens des I. Mittelfußknochens .....	20
Verlust der Zehen II bis V oder I bis III .....	10
Verlust aller Zehen an einem Fuß .....	20
Verlust aller Zehen an beiden Füßen .....	30
Versteifung beider Hüftgelenke je nach Stellung .....	80 – 100
Versteifung eines Hüftgelenks	
in günstiger Stellung .....	40
Die Versteifung eines Hüftgelenks in leichter Abspreizstellung von ca. 10°, mittlerer Drehstellung und leichter Beugstellung gilt als günstig.	

in ungünstiger Stellung .....	50 – 60
Ungünstig sind Hüftgelenkversteifungen in stärkerer Adduktions-, Abduktions- oder Beugestellung.	
Bewegungseinschränkung der Hüftgelenke	
geringen Grades	
(z.B. Streckung/Beugung bis zu 0-10-90 mit entsprechender Einschränkung der Dreh- und Spreizfähigkeit)	
einseitig .....	10 – 20
beidseitig .....	20 – 30
mittleren Grades	
(z.B. Streckung/Beugung bis zu 0-30-90 mit entsprechender Einschränkung der Dreh- und Spreizfähigkeit)	
einseitig .....	30
beidseitig .....	50
stärkeren Grades	
einseitig .....	40
beidseitig .....	60 – 100
Hüftdysplasie (einschließlich sogenannte angeborene Hüftluxation)	
für die Dauer der vollständigen Immobilisierung .....	100
danach bis zum Abschluss der Spreizbehandlung .....	50
Anschließend und bei unbehandelten Fällen richtet sich der GdS nach der Instabilität und der Funktionsbeeinträchtigung.	
Hüftgelenksresektion je nach Funktionsstörung .....	50 – 80
Schnappende Hüfte .....	0 – 10
Beinverkürzung	
bis 2,5 cm .....	0
über 2,5 cm bis 4 cm .....	10
über 4 cm bis 6 cm .....	20
über 6 cm .....	wenigstens 30

## GdS-Tabelle

## Oberschenkelgelenk

straff ..... 50

schlaff ..... 70

Faszienlücke (Muskelhernie) am Oberschenkel ..... 0 – 10

Versteifung beider Kniegelenke ..... 80

## Versteifung eines Kniegelenks

in günstiger Stellung (Beugstellung von 10 – 15°) ..... 30

in ungünstiger Stellung ..... 40 – 60

## Lockerung des Kniebandapparates

muskulär kompensierbar ..... 10

unvollständig kompensierbar, Gangunsicherheit ..... 20

Versorgung mit einem Stützapparat,  
je nach Achsenfehlstellung ..... 30 – 50

## Kniescheibenbruch

nicht knöchern verheilt ohne Funktionseinschränkung des  
Streckapparates ..... 10

nicht knöchern verheilt mit Funktionseinschränkung des  
Streckapparates ..... 20 – 40

## Habituelle Kniescheibenverrenkung

seltene Ausrenkung (in Abständen von 1 Jahr und mehr) ..... 0 – 10

häufiger ..... 20

## Bewegungseinschränkung im Kniegelenk

## geringen Grades

(z.B. Streckung/Beugung bis 0-0-90)

einseitig ..... 0 – 10

beidseitig ..... 10 – 20

## mittleren Grades

(z.B. Streckung/Beugung 0-10-90)

einseitig ..... 20

beidseitig ..... 40

stärkeren Grades (z.B. Streckung/Beugung 0-30-90)	
einseitig .....	30
beidseitig .....	50
Ausgeprägte Knorpelschäden der Kniegelenke (z.B. Chondromalacia patellae Stadium II – IV) mit anhaltenden Reizerscheinungen,	
einseitig	
ohne Bewegungseinschränkung .....	10 – 30
mit Bewegungseinschränkung .....	20 – 40
Schienbeinpseudarthrose	
straff .....	20 – 30
schlaff .....	40 – 50
Teilverlust oder Pseudarthrose des Wadenbeins .....	0 – 10
Versteifung des oberen Sprunggelenks in günstiger Stellung (Plantarflexion um 5° bis 15°) .....	20
Versteifung des unteren Sprunggelenks in günstiger Stellung (Mittelstellung) .....	10
Versteifung des oberen und unteren Sprunggelenks	
in günstiger Stellung .....	30
in ungünstiger Stellung .....	40
Bewegungseinschränkung im oberen Sprunggelenk	
geringen Grades .....	0
mittleren Grades (Heben/Senken 0-0-30) .....	10
stärkeren Grades .....	20
Bewegungseinschränkung im unteren Sprunggelenk .....	0 – 10
Klumpfuß je nach Funktionsstörung	
einseitig .....	20 – 40
beidseitig .....	30 – 60
Andere Fußdeformitäten	
ohne wesentliche statische Auswirkungen (z.B. Senk-Spreizfuß, Hohlfuß, Knickfuß, auch posttraumatisch) .....	0

GdS-Tabelle

mit statischer Auswirkung je nach Funktionsstörung	
geringen Grades .....	10
stärkeren Grades .....	20
Versteifung aller Zehen eines Fußes	
in günstiger Stellung .....	10
in ungünstiger Stellung .....	20
Versteifungen oder Verkrümmungen von Zehen außer der Großzehe .....	0
Versteifung der Großzehengelenke	
in günstiger Stellung .....	0 – 10
in ungünstiger Stellung (z.B. Plantarflexion im Grundgelenk über 10°) .....	20
Narben nach größeren Substanzverlusten an Ferse und Fußsohle	
mit geringer Funktionsbehinderung .....	10
mit starker Funktionsbehinderung .....	20 – 30
Nervenausfälle (vollständig)	
Plexus lumbosacralis .....	80
N. glutaesus superior .....	20
N. glutaesus inferior .....	20
N. cutaneus femoralis lat .....	10
N. femoralis .....	40
N. ischiadicus	
proximal .....	60
distal (Ausfall der Nn. peronaeus communis und tibialis) .....	50
N. peronaeus communis oder profundus .....	30
N. peronaeus superficialis .....	20
N. tibialis .....	30
Trophische Störungen sind zusätzlich zu berücksichtigen. Teilausfälle der genannten Nerven sind entsprechend geringer zu bewerten.	
Völlige Gebrauchsunfähigkeit eines Beines .....	80



**Teil C**  
**Begutachtung im Sozialen**  
**Entschädigungsrecht**





## 1. Grundsätze zur Begutachtung im Sozialen Entschädigungsrecht

1

Die Grundsätze, die im Sozialen Entschädigungsrecht zur Anerkennung einer Gesundheitsstörung als Folge einer Schädigung maßgebend sind, werden in diesem Teil der Versorgungsmedizinischen Grundsätze aufgestellt. Die Auswirkungen der als Schädigungsfolgen anerkannten Gesundheitsstörungen werden mit einem Grad der Schädigungsfolgen bewertet. Die ärztliche Bewertung der Auswirkungen der Schädigungsfolgen erfolgt nach Teil A und Teil B.

Als Voraussetzung für die ärztliche Begutachtung des ursächlichen Zusammenhangs müssen alle Tatsachen festgestellt sein. Die Feststellung der Tatsachen erfolgt unabhängig von kausalen Erwägungen. Es muss unterschieden werden zwischen ärztlicher Begutachtung im Rahmen der Tatsachenermittlung und der ärztlichen Begutachtung des ursächlichen Zusammenhangs.

## 2. Tatsachen für die Begutachtung des ursächlichen Zusammenhangs

2

### 2.1 Tatsachen

Vor der ärztlichen Begutachtung des ursächlichen Zusammenhangs müssen folgende Tatsachen festgestellt und voll bewiesen sein:

- a) das Ereignis, das bei nachgewiesenem ursächlichem Zusammenhang das schädigende Ereignis ist,
- b) die Gesundheitsstörung, die bei nachgewiesenem ursächlichem Zusammenhang die gesundheitliche Schädigung ist (primäre Gesundheitsstörung), und
- c) die Gesundheitsstörung, die bei nachgewiesenem ursächlichem Zusammenhang die Schädigungsfolge ist (sekundäre Gesundheitsstörung).

### 2.2 Ereignis

Die in Betracht kommenden schädigenden Ereignisse unterscheiden sich je nach den Voraussetzungen der verschiedenen Gesetze des Sozialen Entschädigungsrechts. Ereignis in diesem Sinne kann sein:

- a) ein zeitlich begrenztes Ereignis,
- b) ein über einen längeren Zeitraum einwirkendes Ereignis (andauerndes Ereignis) oder
- c) wiederkehrende Ereignisse, die sich in ihrer Gesamtheit auswirken.

Es gibt aktiv einwirkende Ereignisse und passive Ereignisse durch Unterlassen.

### 2.3 Primäre Gesundheitsstörung

Primäre Gesundheitsstörungen sind solche, die nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft durch ein unter Nummer 2.2 beschriebenes Ereignis hervorgerufen werden können und zeitlich als erste auftreten.

### 2.4 Sekundäre Gesundheitsstörung

Sekundäre Gesundheitsstörungen sind solche, die nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft aus der primären Gesundheitsstörung entstehen können.

## 3 3. Ursächlicher Zusammenhang

---

### 3.1 Allgemeines

Nur wenn die unter Nummer 2.1 genannten Tatsachen ermittelt und im Sinne von Nummer 2.1 bewiesen sind, kann die ärztliche Begutachtung des ursächlichen Zusammenhangs erfolgen. Die Gesundheitsstörungen, die vor Eintritt des schädigenden Vorgangs bestanden haben oder bei Eintritt bestehen, sind von der primären und sekundären Gesundheitsstörung abzugrenzen.

### 3.2 Kausalkette

Zwischen dem Ereignis, der primären und der sekundären Gesundheitsstörung muss ein nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft nicht unterbrochener ursächlicher Zusammenhang bestehen. Die primäre Gesundheitsstörung muss durch das Ereignis verursacht sein und die sekundäre Gesundheitsstörung muss durch die primäre Gesundheitsstörung verursacht sein. Erst in diesem Fall ist der ursächliche Zusammenhang gegeben.

### 3.3 Schädigendes Ereignis, gesundheitliche Schädigung, Schädigungsfolge

Ist der ursächliche Zusammenhang im Sinne von Nummer 3.2 zu bejahen, ist

- a) das Ereignis das schädigende Ereignis,
- b) die primäre Gesundheitsstörung die gesundheitliche Schädigung und
- c) die sekundäre Gesundheitsstörung die Gesundheitsstörung als Folge der Schädigung (Schädigungsfolge).

### 3.4 Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs

3.4.1 Für die Annahme des ursächlichen Zusammenhangs genügt entschädigungsrechtlich die Wahrscheinlichkeit. Sie ist gegeben, wenn nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft mehr für als gegen einen ursächlichen

## Begutachtung im Sozialen Entschädigungsrecht

Zusammenhang spricht. Es reicht für die Annahme des ursächlichen Zusammenhangs nicht aus, dass dieser nur möglich ist.

- 3.4.2 Haben konkurrierende Ursachen zur primären Gesundheitsstörung beigetragen und kommt einem Ereignis gegenüber der Gesamtheit der anderen Ursachen eine mindestens gleichwertige Bedeutung zu, ist alleine jenes Ereignis schädigendes Ereignis und wesentliche Ursache im entschädigungsrechtlichen Sinn.
- 3.4.3 Nummer 3.4.2 gilt entsprechend, wenn die sekundäre Gesundheitsstörung auf konkurrierenden Ursachen beruht.

## 4. Kann-Versorgung

4

- 4.1 Im Sozialen Entschädigungsrecht muss anhand des Sachverhaltes in jedem Einzelfall stets zuerst geprüft werden, ob nach Nummer 3.4 der ursächliche Zusammenhang mit Wahrscheinlichkeit beurteilt werden kann. Lässt sich dabei die Frage des ursächlichen Zusammenhangs bereits in ihrer Gesamtheit bejahen oder verneinen, ist die entsprechende Prüfung abgeschlossen und eine Kann-Versorgung kommt nicht in Betracht.
- 4.2 Lässt sich die Frage des ursächlichen Zusammenhangs im Sinne von Nummer 3.4 nicht bejahen oder verneinen, kann in Ausnahmefällen eine Gesundheitsstörung im Sinne der Kann-Versorgung als Schädigungsfolge anerkannt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die zur Anerkennung einer Gesundheitsstörung als Folge einer Schädigung erforderliche Wahrscheinlichkeit nur deshalb nicht gegeben ist, weil über die Ursache der festgestellten Gesundheitsstörung in der medizinischen Wissenschaft Ungewissheit besteht.
- 4.3 Eine Kann-Versorgung kommt nur dann in Betracht, wenn die einer Gesundheitsstörung zugrundeliegende Ursache (Ätiologie) nicht durch den aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft gesichert ist und wenn fundierte wissenschaftliche Arbeitshypothesen einen ursächlichen Zusammenhang begründen. Eine von dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft abweichende subjektive Auffassung eines einzelnen Wissenschaftlers oder einer einzelnen Wissenschaftlerin ist nicht mit Ungewissheit in der medizinischen Wissenschaft gleichzusetzen.
- 4.4 Eine Kann-Versorgung rechtfertigen nicht:
- Zweifel über den Zeitpunkt der Entstehung der Gesundheitsstörung,
  - mangelnde diagnostische Klärung,
  - unzureichende Sachverhaltsaufklärung oder
  - sonstige Ungewissheiten im Sachverhalt.

4.5 Ist die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs nur für einen Teil einer Gesundheitsstörung gegeben, so ist zu prüfen, ob für den verbleibenden Teil der Gesundheitsstörung die Voraussetzungen für eine Kann-Versorgung vorliegen.

## 5. Anerkennung der Schädigungsfolge im Sinne der Entstehung und Anerkennung der Schädigungsfolge im Sinne der Verschlimmerung

5

### 5.1 Allgemeines

Bei Vorliegen des ursächlichen Zusammenhangs ist auf der Grundlage des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft zu beurteilen, ob das schädigende Ereignis zur Entstehung oder zur Verschlimmerung der Gesundheitsstörung geführt hat.

### 5.2 Anerkennung im Sinne der Entstehung

Die Anerkennung einer Gesundheitsstörung als Schädigungsfolge im Sinne der Entstehung setzt voraus, dass keine medizinischen Tatsachen festzustellen sind, die rückblickend nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft belegen, dass die Gesundheitsstörung zur Zeit der Einwirkung des schädigenden Ereignisses bereits bestand.

### 5.3 Anerkennung im Sinne der Verschlimmerung

Wenn medizinische Tatsachen festzustellen sind, die rückblickend nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft belegen, dass die Gesundheitsstörung zur Zeit der Einwirkung des schädigenden Ereignisses bereits - auch unbemerkt - bestand, kommt nur eine Anerkennung der Gesundheitsstörung als Schädigungsfolge im Sinne der Verschlimmerung in Betracht. Eine solche Anerkennung setzt voraus, dass das schädigende Ereignis dazu führt,

- a) dass der Zeitpunkt vorverlegt wird, an dem die Gesundheitsstörung sonst in Erscheinung getreten wäre, oder
- b) dass die Gesundheitsstörung in stärkerer Ausprägung auftritt, als es sonst zu erwarten wäre.

### 5.4 Zunahme der Ausprägung der Gesundheitsstörung

Bei jeder weiteren Zunahme der Ausprägung der als Schädigungsfolge anerkannten Gesundheitsstörung ist zu prüfen, ob auch diese Zunahme noch ursächlich auf das schädigende Ereignis zurückzuführen ist. Bei jeder weiteren Zunahme der Ausprägung der Gesundheitsstörung muss der ursächliche Zusammenhang dieser Weiterentwicklung beurteilt werden.

## 6. Bestimmung des Grades der Schädigungsfolgen

6

### 6.1 Vorübergehende Gesundheitsstörungen

Vorübergehende Gesundheitsstörungen sind bei der Feststellung des Grades der Schädigungsfolgen nicht zu berücksichtigen. Als vorübergehend gilt ein Zeitraum von bis zu sechs Monaten.

### 6.2 Bereits bestehende Gesundheitsstörungen

6.2.1 Vor der Feststellung des Grades der Schädigungsfolgen ist zu prüfen, ob vor dem schädigenden Ereignis bereits eine Teilhabebeeinträchtigung durch eine nicht schädigungsbedingte Gesundheitsstörung (bereits bestehende Gesundheitsstörung) vorlag. Diese Teilhabebeeinträchtigung muss festgestellt werden. Auch für die Gesamtauswirkung der vorhandenen Gesundheitsstörungen ist ein Grad der Behinderung anzugeben. Der Grad der Schädigungsfolgen gibt allein das Ausmaß der Auswirkungen der Schädigungsfolgen wieder.

6.2.2 Befinden sich die bereits bestehende Gesundheitsstörung und die Schädigungsfolge an verschiedenen Körperteilen und beeinflussen sich nicht gegenseitig, hat die bereits bestehende Gesundheitsstörung keine Auswirkung auf den Grad der Schädigungsfolgen.

6.2.3 Hat die Schädigung eine Gliedmaße oder ein Organ mit bereits bestehender Gesundheitsstörung betroffen, muss der Grad der Schädigungsfolgen niedriger sein als der Grad der Behinderung, der sich aus der nun bestehenden gesamten Gesundheitsstörung ergeben würde. Der Grad der Schädigungsfolgen lässt sich dabei nicht einfach dadurch ermitteln, dass die Teilhabebeeinträchtigung der bereits bestehenden Gesundheitsstörung vom Grad der Behinderung der gesamten Gesundheitsstörung abgezogen wird. Maßgeblich ist vielmehr, zu welchen zusätzlichen Auswirkungen die Schädigung geführt hat. Wenn jedoch die bereits bestehende Gesundheitsstörung nach ihrem Umfang oder nach ihrer Art keine wesentliche Bedeutung für die gesamte Gesundheitsstörung hat, ist der Grad der Schädigungsfolgen genauso hoch wie der Grad der Behinderung, der sich aus der nun bestehenden gesamten Gesundheitsstörung ergibt.

6.2.4 Sind durch die bereits bestehende schädigungsunabhängige Gesundheitsstörung und durch die Schädigungsfolge verschiedene Organe, Gliedmaßen oder paarige Organe betroffen und verstärkt die bereits bestehende schädigungsunabhängige Gesundheitsstörung die Auswirkungen der schädigungsbedingten Funktionsstörung, ist der Grad der Schädigungsfolgen höher zu bewerten als bei isolierter Betrachtung der Schädigungsfolge.

### **6.3 Veränderung des Grades der Schädigungsfolgen**

- 6.3.1 Ein schädigendes Ereignis kann zu einer zeitlich begrenzten Zunahme der Ausprägung einer Gesundheitsstörung führen und damit zu keinem oder nur zeitlich begrenzt zu einem Grad der Schädigungsfolgen.
- 6.3.2 Ein schädigendes Ereignis kann anhaltend, aber abgrenzbar den weiteren Verlauf der Gesundheitsstörung beeinflussen und damit zu einem gleichbleibenden Grad der Schädigungsfolgen führen.
- 6.3.3 Ein schädigendes Ereignis kann aber auch den weiteren Verlauf der Gesundheitsstörung richtunggebend bestimmen und damit Anlass für einen ansteigenden Grad der Schädigungsfolgen sein.

### **6.4 Nachfolgende Gesundheitsstörung**

Eine Gesundheitsstörung, die zeitlich nach der Schädigungsfolge eingetreten ist und nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Schädigung steht, wird bei der Bewertung des Grades der Schädigungsfolgen nicht berücksichtigt.

## **7** 7. Folgeschaden

---

Tritt nach einer Schädigung eine weitere Gesundheitsstörung ein und kommt der Schädigung oder deren Folgen für die Entstehung dieser Gesundheitsstörung eine mindestens gleichwertige Bedeutung gegenüber der Gesamtheit der anderen Ursachen zu, handelt es sich um einen Folgeschaden. Dieser ist bei der Feststellung des Grades der Schädigungsfolgen zu berücksichtigen. In diesem Falle ist stets zu prüfen, ob die anerkannte Schädigungsfolge auch gemäß dem gegenwärtig aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft anerkannt würde.

## **8** 8. Folgen von medizinischen Maßnahmen

---

Haben diagnostische oder therapeutische Maßnahmen, die wegen Schädigungsfolgen durchgeführt werden, nachteilige gesundheitliche Folgen, so sind auch diese gesundheitlichen Folgen Schädigungsfolgen. Auch das Unterlassen einer medizinisch gebotenen Maßnahme kann zu einer gesundheitlichen Schädigung und damit zu einer Schädigungsfolge führen.

## **9** 9. Absichtlich herbeigeführte Gesundheitsstörungen

---

Eine von der antragstellenden Person absichtlich herbeigeführte Schädigung führt entschädigungsrechtlich nicht zu einer Schädigungsfolge. Eine Selbsttötung, die

Folgen eines Selbsttötungsversuchs oder eine absichtlich herbeigeführte Gesundheitsstörung können nur dann Schädigungsfolge sein, wenn eine Beeinträchtigung der freien Willensbestimmung durch entschädigungsrechtlich geschützte Tatbestände wahrscheinlich ist.

## 10. Ursächlicher Zusammenhang zwischen Schädigung und Tod

10

- 10.1 Hat eine als Schädigungsfolge anerkannte Gesundheitsstörung den Tod verursacht und liegt zum Zeitpunkt des Todes eine Anerkennung der Gesundheitsstörung vor, gilt der Tod als Schädigungsfolge. Eine erneute Begutachtung der Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhanges ist nicht erforderlich, es sei denn, die bisherige Anerkennung ist aus heutiger Sicht zweifelsfrei unrichtig.
- 10.2 Stirbt eine geschädigte Person an einer im Sinne der Verschlimmerung anerkannten Gesundheitsstörung, so gilt der Tod als Schädigungsfolge, wenn die schädigungsbedingte Verschlimmerung für den Tod ursächlich gewesen ist.
- 10.3 Haben mehrere Gesundheitsstörungen zum Tod beigetragen und sind nicht alle diese Gesundheitsstörungen auch Schädigungsfolgen, ist zu prüfen, ob die Schädigungsfolgen eine mindestens gleichwertige Bedeutung für den Eintritt des Todes hatten. In diesem Fall gilt der Tod als Schädigungsfolge.
- 10.4 In Ausnahmefällen kann bei der Prüfung nach Nummer 10.2 auch der Zeitpunkt des Todes eine wichtige Rolle spielen, wenn neben den Schädigungsfolgen eine schwere, schädigungsunabhängige Gesundheitsstörung vorgelegen hat, die nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft ohne die Schädigungsfolgen noch nicht zu diesem Zeitpunkt, jedoch in absehbarer Zeit für sich allein zum Tode geführt hätte. In diesem Fall gilt der Tod als Schädigungsfolge, wenn die geschädigte Person ohne die Schädigungsfolgen wahrscheinlich mindestens ein Jahr länger gelebt hätte als mit den Schädigungsfolgen.

## 11. (gestrichen)

11

## 12. (gestrichen)

12

## 13. Voraussetzungen für die Pflegezulage, Pflegezulagestufen

13

- a) Pflegezulage wird bewilligt, solange Beschädigte infolge der Schädigung so hilflos sind, dass sie für eine Reihe von häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd bedürfen. Diese Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Hilfe in Form einer Überwachung oder Anleitung zu den genannten Verrichtungen erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd geleistet werden muss, jedoch eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung erforderlich ist.
- b) Die Hilflosigkeit muss durch die Folgen der Schädigung verursacht sein. Dabei ist es nicht erforderlich, dass sie ausschließlich oder überwiegend auf eine Schädigungsfolge zurückzuführen ist. Es genügt, dass für den Eintritt der Hilflosigkeit – oder auch für eine Erhöhung des Pflegebedürfnisses – die Schädigungsfolge eine annähernd gleichwertige Bedeutung gegenüber anderen Gesundheitsstörungen hat.
- c) Die Pflegezulage wird in sechs Stufen bewilligt. Für dauerndes Krankenlager oder dauernd außergewöhnliche Pflege sind die Stufen II bis VI vorgesehen.
- d) Ein dauerndes außergewöhnliches Pflegebedürfnis liegt vor, wenn der Aufwand an Pflege etwa in gleichem Umfang wie bei dauerndem Krankenlager einer beschädigten Person notwendig ist. Dauerndes Krankenlager setzt nicht voraus, dass man das Bett überhaupt nicht verlassen kann.
- e) Bei Doppelamputierten ohne weitere Gesundheitsstörungen – ausgenommen Doppel-Unterschenkelamputierten – ist im allgemeinen eine Pflegezulage nach Stufe I angemessen, ohne Rücksicht darauf, ob es sich um paarige oder nicht-paarige Gliedverluste (Oberarm, Unterarm, ganze Hand, Oberschenkel, Unterschenkel, ganzer Fuß) handelt. Sofern nicht besondere Umstände eine höhere Einstufung rechtfertigen sind folgende Stufen der Pflegezulage angemessen:
1. Bei Verlust beider Beine im Oberschenkel: ..... Stufe II
  2. Bei Verlust beider Hände oder Unterarme: ..... Stufe III
  3. Bei Verlust beider Arme im Oberarm oder dreier Gliedmaßen: ..... Stufe IV.
- f) Die Pflegezulage nach Stufe V kommt in Betracht, wenn ein außergewöhnlicher Leidenszustand vorliegt und die Pflege besonders hohe Aufwendungen erfordert. Dies trifft immer zu bei
1. Querschnittgelähmten mit Blasen- und Mastdarmlähmung,
  2. Hirnbeschädigten mit schweren psychischen und physischen Störungen, und Gebrauchsbehinderungen mehrerer Gliedmaßen,



## Begutachtung im Sozialen Entschädigungsrecht

3. Ohnhändern mit Verlust beider Beine im Oberschenkel,
  4. blinden Doppel-Oberschenkelamputierten,
  5. Blinden mit völligem Verlust einer oberen und einer unteren Gliedmaße.
- g) Besonders schwer betroffene Beschädigte erhalten eine Pflegezulage nach Stufe VI. Es handelt sich dabei um
1. Blinde mit völligem Hörverlust,
  2. blinde Ohnhänder,
  3. Beschädigte mit Verlust beider Arme im Oberarm und beider Beine im Oberschenkel,
  4. Beschädigte, bei denen neben einem Leidenszustand, der bereits die Gewährung einer Pflegezulage nach Stufe V rechtfertigt, noch eine weitere Gesundheitsstörung vorliegt, die das Pflegebedürfnis wesentlich erhöht (z.B. erhebliche Gebrauchsbehinderung beider Arme bei vollständiger Lähmung beider Beine mit Blasen- und Mastdarmlähmung), sowie
  5. andere Beschädigte, deren außergewöhnlicher Leidenszustand und deren Pflegebedürfnis denen der vorgenannten Beschädigten vergleichbar sind.
- h) Bei Säuglingen und Kleinkindern ist – auch hinsichtlich der Pflegezulagestufe – nur der Teil der Hilflosigkeit zu berücksichtigen, der den Umfang des Hilfsbedürfnisses eines gesunden gleichaltrigen Kindes überschreitet.
- i) Erwerbsunfähige Hirnbeschädigte erhalten eine Pflegezulage mindestens nach Stufe I, wenn die Hirnbeschädigung allein die Erwerbsunfähigkeit bedingt. Ob bei erwerbsunfähigen Hirnbeschädigten eine höhere Pflegezulage als Stufe I in Betracht kommt, ist im Einzelfall nach den Auswirkungen der Krankheitserscheinungen zu entscheiden. Der Grad der psychischen Störungen und die Art und Häufigkeit von Anfällen sind dabei besonders zu berücksichtigen.
- j) Bei Beschädigten mit schweren geistigen oder seelischen Störungen, die wegen dauernder und außergewöhnlicher motorischer Unruhe ständiger Aufsicht bedürfen (z.B. erethische Kinder), sind die Voraussetzungen für eine Pflegezulage mindestens nach Stufe III gegeben.
- k) Blinde erhalten mindestens die Pflegezulage nach Stufe III. Treten bei Blinden weitere Gesundheitsstörungen, vor allem Störungen der Ausgleichsfunktion hinzu, die unter Beachtung von Buchstabe b bei der gebotenen Gesamtbetrachtung das Pflegebedürfnis über den tatsächlichen Bedarf der Stufe III hinaus erhöhen, so ist die Pflegezulage nach Stufe IV zu bewilligen, wenn nicht nach Buchstabe f oder g die Pflegezulage nach Stufe V oder VI zusteht. Hochgradig Sehbehinderte erfüllen grundsätzlich die Voraussetzungen für die Gewährung einer Pflegezulage nach Stufe I.



**Teil D**  
**Merkzeichen**



## 1. Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr (Merkzeichen G)

1

- a) Nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) ist zu beurteilen, ob ein behinderter Mensch infolge seiner Behinderung in seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist. Hilflose und Gehörlose haben stets einen Anspruch auf unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr.
- b) In seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist, wer infolge einer Einschränkung des Gehvermögens, auch durch innere Leiden, oder infolge von Anfällen oder von Störungen der Orientierungsfähigkeit nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder nicht ohne Gefahren für sich oder andere Wegstrecken im Ortsverkehr zurückzulegen vermag, die üblicherweise noch zu Fuß zurückgelegt werden. Bei der Prüfung der Frage, ob diese Voraussetzungen vorliegen, kommt es nicht auf die konkreten örtlichen Verhältnisse des Einzelfalles an, sondern darauf, welche Wegstrecken allgemein – d.h. altersunabhängig von nicht behinderten Menschen – noch zu Fuß zurückgelegt werden. Als ortsübliche Wegstrecke in diesem Sinne gilt eine Strecke von etwa zwei Kilometern, die in etwa einer halben Stunde zurückgelegt wird.
- c) Auch bei Säuglingen und Kleinkindern ist die gutachtliche Beurteilung einer erheblichen Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erforderlich. Für die Beurteilung sind dieselben Kriterien wie bei Erwachsenen mit gleichen Gesundheitsstörungen maßgebend. Es ist nicht zu prüfen, ob tatsächlich diesbezügliche behinderungsbedingte Nachteile vorliegen oder behinderungsbedingte Mehraufwendungen entstehen.
- d) Die Voraussetzungen für die Annahme einer erheblichen Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr infolge einer behinderungsbedingten Einschränkung des Gehvermögens sind als erfüllt anzusehen, wenn auf die Gehfähigkeit sich auswirkende Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen und/oder der Lendenwirbelsäule bestehen, die für sich einen GdB von wenigstens 50 bedingen. Darüber hinaus können die Voraussetzungen bei Behinderungen an den unteren Gliedmaßen mit einem GdB unter 50 gegeben sein, wenn diese Behinderungen sich auf die Gehfähigkeit besonders auswirken, z.B. bei Versteifung des Hüftgelenks, Versteifung des Knie- oder Fußgelenks in ungünstiger Stellung, arteriellen Verschlusskrankheiten mit einem GdB von 40. Auch bei inneren Leiden kommt es bei der Beurteilung entscheidend auf die Einschränkung des Gehvermögens an. Dementsprechend ist eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit vor allem bei Herzschäden mit Beeinträchtigung der Herzleistung wenigstens nach Gruppe 3 und bei Atembehinderungen mit dauernder Einschränkung der Lungenfunktion wenigstens

mittleren Grades anzunehmen. Auch bei anderen inneren Leiden mit einer schweren Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit, z.B. chronische Niereninsuffizienz mit ausgeprägter Anämie, sind die Voraussetzungen als erfüllt anzusehen.

- e) Bei hirnorganischen Anfällen ist die Beurteilung von der Art und Häufigkeit der Anfälle sowie von der Tageszeit des Auftretens abhängig. Im Allgemeinen ist auf eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit erst ab einer mittleren Anfallshäufigkeit mit einem GdS von wenigstens 70 zu schließen, wenn die Anfälle überwiegend am Tage auftreten. Analoges gilt beim Diabetes mellitus mit häufigen hypoglykämischen Schocks.
- f) Störungen der Orientierungsfähigkeit, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit führen, sind bei allen Sehbehinderungen mit einem GdB von wenigstens 70 und bei Sehbehinderungen, die einen GdB von 50 oder 60 bedingen, nur in Kombination mit erheblichen Störungen der Ausgleichsfunktion (z.B. hochgradige Schwerhörigkeit beiderseits, geistige Behinderung) anzunehmen. Bei Hörbehinderungen ist die Annahme solcher Störungen nur bei Taubheit oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit im Kindesalter (in der Regel bis zum 16. Lebensjahr) oder im Erwachsenenalter bei diesen Hörstörungen in Kombination mit erheblichen Störungen der Ausgleichsfunktion (z.B. Sehbehinderung, geistige Behinderung) gerechtfertigt. Bei geistig behinderten Menschen sind entsprechende Störungen der Orientierungsfähigkeit vorauszusetzen, wenn die behinderten Menschen sich im Straßenverkehr auf Wegen, die sie nicht täglich benutzen, nur schwer zurechtfinden können. Unter diesen Umständen ist eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit bei geistigen Behinderungen mit einem GdB von 100 immer und mit einem GdB von 80 oder 90 in den meisten Fällen zu bejahen. Bei einem GdB unter 80 kommt eine solche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit nur in besonders gelagerten Einzelfällen in Betracht.

## 2. Berechtigung für eine ständige Begleitung (Merkzeichen B)

### 2

- a) Für die unentgeltliche Beförderung einer Begleitperson ist nach dem SGB IX die Berechtigung für eine ständige Begleitung zu beurteilen. Auch bei Säuglingen und Kleinkindern ist die gutachtliche Beurteilung der Berechtigung für eine ständige Begleitung erforderlich. Für die Beurteilung sind dieselben Kriterien wie bei Erwachsenen mit gleichen Gesundheitsstörungen maßgebend. Es ist nicht zu prüfen, ob tatsächlich diesbezügliche behinderungsbedingte Nachteile vorliegen oder behinderungsbedingte Mehraufwendungen entstehen.

## Merkzeichen

- b) Eine Berechtigung für eine ständige Begleitung ist bei schwerbehinderten Menschen (bei denen die Voraussetzungen für die Merkzeichen „G“, „Gl“ oder „H“ vorliegen) gegeben, die bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung regelmäßig auf fremde Hilfe angewiesen sind. Dementsprechend ist zu beachten, ob sie bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel regelmäßig auf fremde Hilfe beim Ein- und Aussteigen oder während der Fahrt des Verkehrsmittels angewiesen sind oder ob Hilfen zum Ausgleich von Orientierungsstörungen (z.B. bei Sehbehinderung, geistiger Behinderung) erforderlich sind.
- c) Die Berechtigung für eine ständige Begleitung ist anzunehmen bei  
 Querschnittgelähmten,  
 Ohnhändern,  
 Blinden und  
 Sehbehinderten, Hörbehinderten, geistig behinderten Menschen und Anfalls-  
 kranken, bei denen die Annahme einer erheblichen Beeinträchtigung der  
 Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr gerechtfertigt ist.

**3. (aufgehoben)\*****3****4. Gehörlosigkeit (Merkzeichen Gl)****4**

Gehörlos sind nicht nur Hörbehinderte, bei denen Taubheit beiderseits vorliegt, sondern auch Hörbehinderte mit einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit beiderseits, wenn daneben schwere Sprachstörungen (schwer verständliche Lautsprache, geringer Sprachschatz) vorliegen. Das sind in der Regel Hörbehinderte, bei denen die an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit angeboren oder in der Kindheit erworben worden ist.

\* Die Voraussetzungen für das Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) findet sich jetzt in § 229 Abs. 3 SGB IX.

## Abkürzungsverzeichnis

BVG	Bundesversorgungsgesetz
GdB	Grad der Behinderung
GdS	Grad der Schädigungsfolgen
SGB	Sozialgesetzbuch
StVG	Straßenverkehrsgesetz
VersMedV	Versorgungsmedizin-Verordnung
WDB	Wehrdienstbeschädigung
ZDB	Zivildienstbeschädigung
ZDG	Zivildienstgesetz



# **Stichwortverzeichnis**

(Die Zahlen hinter den Stichwörtern verweisen auf die entsprechenden Kapitel)

**A**

Adipositas .....	B 15.3	Anus praeter .....	B 10.2.4
Adnexe .....	B 14.3+4	Aphakie .....	B 4.2
After .....	B 10.2.4	Aphasie .....	B 3.1.2
Agnosie .....	A 6c; B 3.1.2	Apraxie .....	B 3.1.2
AIDS .....	B 16.11	Arterielle Verschlusskrankheiten .	B 9.2.1
Akne .....	B 17.3	Arthrose .....	B 18
Alkoholkrankheit .....	B 3.8	Artikulationsstörung .....	B 7.2; B 7.11
Allergie .....	A 5d rr; B 17.1	Asthma bronchiale .	A 5d gg; B 8.5; B 8.6
Anämien .....	B 16.9	Atemwege, tiefere .....	B 8
Anerkennung im Sinne der Entstehung .....	C 5.2	Auge .....	B 4
Anerkennung im Sinne der Verschlimmerung .....	C 5.2	Augenlid .....	B 4.4
Aneurysmen (der Gefäße) .....	B 9.2.2	Augenmuskellähmung .....	B 4.4
Anfallsleiden .....	A 5 d cc; B 3.1.a+2; C 13; D 2c	Augenverlust .....	B 4.1
Antikoagulation .....	B 16.10	Autismus .....	A 5d bb; B 3.5
		Autoimmunkrankheiten des Bindegewebes .....	A 5d pp; B 17.5

**B**

Bauchspeicheldrüse .....	B 10.3.6	Blut .....	B 16
Bauchwandhernien .....	B 11.2	Bluterkrankheit .....	A 5d oo; B 16.10
Becken .....	B 18.10	Bluthochdruck .....	B 9.3
Begleitung ständige .....	D 2	Bronchialasthma ..	A 5d gg; B 8.5; B 8.6
Beine .....	B 18.14	Bronchiektasen .....	B 8.2
Bewegungsfähigkeit im Straßenv., Beeinträchtigt .....	D 1	Bronchitis, chronische .....	B 8.2
Bestimmung des Grades der Schädigungsfolgen .....	C6	Brüche .....	B 11
Blindheit .....	A 6; A 4e aa; B 4.2+5+6; C 13; D2	Brust .....	B 14.1
		Brustkorb .....	B 8

**C** **C**

Carcinoma in situ . . . . .	B 1d	Colitis ulcerosa . . . . .	B 10.2.2
Cholangitis . . . . .	B 10.3.5	Crohn-Krankheit . . . . .	B 10.2.2
Cholezystolithiasis . . . . .	B 10.3.5	Cushing-Syndrom . . . . .	B 15.7

**D** **D**

Darm . . . . .	B 10.2.2	Diabetes mellitus . . . . .	A 5d jj; B 15.1; D 1e
Daumen . . . . .	B 18.13	Dialyse . . . . .	A 5d ii; B 12.1.3
Dermatomyositis . . . . .	A 5d pp; B 17.5; B 18.2.2	Drogenabhängigkeit . . . . .	B 3.8

**E** **E**

Eierstock . . . . .	B 14.3+4	Entwicklungsstörungen im Kleinkindalter . . . . .	B 3.4.1
Ekzeme . . . . .	B 17.1	Epilepsie . . . . .	A 5d cc; B 3.1.a+2; C 13; D 2c
Ellenbogen . . . . .	B 18.13	Ereignis, schädigendes . . . . .	C 2.2; C 3.3
Enddarm . . . . .	B 10.2.4	Erysipel, chronisch rezidivierend . . . . .	B 17.10
Endometriose . . . . .	B 14.5	Erythrodermien . . . . .	B 17.8
Endoprothesen . . . . .	B 18.12		
Enteritis regionalis . . . . .	B 10.2.2		

**F** **F**

Farbenfehlsichtigkeit . . . . .	B 4.6	Fibrose der Leber . . . . .	B 10.3.2
Fazialisparese . . . . .	B 2.4	Finger . . . . .	B 18.13
Fettleber . . . . .	B 10.3.3	Folgeschaden . . . . .	C7
Fettstoffwechselstörung . . . . .	B 15.3	Funktionssysteme . . . . .	A 2e
Fibromyalgie . . . . .	B 18.4	Fuß . . . . .	B 18.14

## G

## G

- Gallenkoliken ..... B 10.3.5  
 Gallensteine ..... B 10.3.5  
 Gallenwege ..... B 10.3.5  
 Gastritis ..... B 10.2.1  
 Gaumen ..... B 7.5  
 Gaumenspalte ..... A 5d ff; B 7.6  
 Gebärmutter ..... B 14.2  
 Gefäßkrankheiten ..... B 9.2  
 Gehörlosigkeit ..... D 4  
 geistige Behinderung .. A 5d aa; B 3.4+5  
 Geistige Leistungsfähigkeit ..... B 3.4  
 Gesamt-GdS ..... A 3  
 Geschlechtsorgane, männliche ... B 13  
 Geschlechtsorgane, weibliche ... B 14  
 Geschwüre  
 (Magen; Zwölffingerdarm) .... B 10.2.1  
 Gesicht ..... B 2  
 Gesichtsfeld ..... A 6; B 4  
 Gesichtsfeldausfälle ..... B 4.5  
 Gesichtsnervalgien ..... B 2.2  
 Gesundheitsstörung,  
 absichtlich herbeigeführte ..... C 9  
 Gesundheitsstörung,  
 bereits bestehende ..... C 6.2  
 Gesundheitsstörung,  
 nachfolgende ..... C 6.4  
 Gesundheitsstörung,  
 primäre ..... C 2.1; C 2.3; C 3.4.2  
 Gesundheitsstörung,  
 sekundäre ..... C 2.1; C 2.4; C 3.4.2  
 Gesundheitsstörung,  
 vorübergehende ..... A 2f); C 6.1  
 Gicht ..... B 15.2  
 Gleichgewichtsstörung ..... B 5.3  
 Gliedmaßen, allgemein ..... B 18.11  
 Gliedmaßen, obere ..... B 18.13  
 Gliedmaßen, untere ..... B 18.14  
 Grad der Behinderung ..... A 2  
 Grad der  
 Schädigungsfolgen ..... A 2; C 1; C 6  
 Großwuchs ..... B 18.8  
 Großzehe ..... B 18.14

## H

## H

- Haarausfall ..... B 17.11  
 Haltungs- und Bewegungsorgane . B 18  
 Hämophilie ..... A 5d oo; B 16.10  
 Hämorrhoiden ..... B 10.2.4  
 Hand ..... B 18.13  
 Handgelenk ..... B 18.13  
 Harnableitung, künstliche .... B 12.2.4  
 Harnblasentumor ..... B 12.2.3  
 Harnentleerungsstörung ..... B 12.2.2  
 Harninkontinenz ..... B 12.2.4  
 Harnorgane ..... B 12  
 Harnwege ..... B 12.2

## Stichwortverzeichnis

Harnwegsentzündung	B 12.2.1	Herztransplantation	B 9.1.4
Haut	B 17	Hilflosigkeit	A4 + 5; A6d; C13b+h
Hautkrankheiten, blasenbildende	B 17.6	Hirnschäden	B 3.1
Hauttumor	B 17.13	Hirntumoren	B 3.3
Heilungsbewährung	A 2h; A 7b; B 1c+d	HIV-Infektion	B 16.11
Hemianopsie	A 6b ff+gg; B 4.5	Hoden	B 13.2
Hepar	B 10.3	Hodentumor	B 13.4
Hepatitis, chronische	B 10.3.1	Hodgin-Krankheit	B 16.2
Hernien	B 11	Hörverlust	B 5.2
Herpes simplex, chronisch rezidivierend	B 17.10	Hüfte	B 18.14
Herz	A 5d hh; B 9.1	Hydrozele	B 13.3
Herzrhythmusstörungen	B 9.1.6	Hyperkinesen	B 3.1.2
		Hypertonie, arterielle	B 9.3
		Hyperurikämie	B 15.2

## I

## I

Ichthyosis	B 17.9	Immunsystem	B 16
Immundefekte	A 5d nn; B 16.11	Intelligenzminderung	B 3.4.2

## K

## K

Kannversorgung	C 4	Kollagenosen	B 18.2.2
Kehlkopf	B 7.8	Kopf	B 2
Kiefer	B 7.3	Krampfadern	B 9.2.3
Kieferklemme	B 7.2	Kraurosis vulvae	B 14.6
Kleinwuchs	B 18.7	Kreislauf	B 9
Knie	B 18.14	Künstliche Niere	A 5d ii; B 12.1.3
Knochenmarktransplantation	B 16.8	Kurzdarmsyndrom beim Kind	B 10.2.2

**L****L**

Lähmung .....	B 3.1.2	Leukämien, akute .....	B 16.6
Leber .....	B 10.3	Linsenverlust .....	B 4.2
Lebertransplantation .....	B 10.3.4	Lippendefekt .....	B 7.1
Lebertumor .....	B 10.3.4	Luftwege, obere .....	B 7
Leberzirrhose .....	B 10.3.2	Lunge .....	B 8
Leisten/Schenkelhernie .....	B 11.1	Lungenfunktionseinschränkung ..	B 8.3
Leukämie .....	A 5d mm; B 16	Lungentransplantation .....	B 8.4
Leukämie, chronisch lymphatische .....	B 16.3.1	Lupus erythematodes .....	A 5d pp; B 17.5; B 18.2.2
Leukämie, chronisch myeloische .....	B 16.5	Lymphödem .....	B 9.2.3

**M****M**

Magen .....	B 10.2.1	Morbus Crohn .....	B 10.2.2
Magen-Darm-Krankheiten .....	B 10.2	Morbus Hodgkin .....	B 16.2
Mamma .....	B 14.1	Motilitätsstörungen des Darms .....	B 10.2.2
Mastdarm .....	B 10.2.4	Mukoviszidose .....	A 5d ll; B 15.5
Medizinische Maßnahmen, Folgen ..	C 8	Multiple Sklerose .....	B 3.10
Menière-Krankheit .....	B 5.3	Mundhöhle .....	B 7
Merkzeichen B .....	D 2	Mundöffnung, behinderte .....	B 7.2
Merkzeichen G .....	D 1	Muskelkrankheiten .....	B 18.6
Merkzeichen GI .....	D 4	Myelodysplasien .....	B 16.7
Migräne .....	B 2.3	Myeloproliferative Erkrankungen, chronische .....	B 16.5
Milz .....	B 16.1	Mykosen .....	B 17.10
Mittelohrentzündung, chronische ..	B 5.4		
Morbus Bechterew .....	B 18.2.1		

<b>N</b>		<b>N</b>	
Nabelbruch.....	B 11.2	Niere .....	B 12.1
Naevus.....	B 17.12	Nierenfunktionseinschränkung..	A5dii; B12.1.3; D1d
Narkolepsie .....	B 3.2	Niereninsuffizienz..	A5dii; B12.1.3; D1d
Nase.....	B 6	Nierenstein.....	B 12.1.1
Nasennebenhöhlenentzündung, chronische .....	B 6.2	Nierentransplantation .....	B 12.1.4
Nasenverlust .....	B 6.1	Nierenzellkarzinom .....	B 12.1.4
Nebenniere.....	B 15.7	Non-Hodgin-Lymphome .....	B 16.3
Nephrolithiasis .....	B 12.1.1	Non-Hodgin-Lymphome, hochmaligne .....	B 16.3.2
Nephrotisches Syndrom .....	B 12.1.2	Non-Hodgin-Lymphome, niedrigmaligne.....	B 16.3.1
Nervensystem .....	B 3		
Neurose.....	B 3.7		

<b>O</b>		<b>O</b>	
Oberarm .....	B 18.13	Ösophagus .....	B 10.1
Oberschenkel.....	B 18.14	Osteochondrose .....	B 18
Ohnhänder .....	C 13e+f; D 2c	Osteogenesis imperfecta .....	A 5d qq; B 18.7
Ohrgeräusche .....	B 5.3	Osteomyelitis, chronische .....	B 18.5
Ohrmuschel .....	B 5.5	Osteoporose.....	B 18
Organe, blutbildende.....	B 16	Ozeana.....	B 6.2
Orientierungsfähigkeit.....	D 1b; D 2		

<b>P</b>		<b>P</b>	
Pankreas .....	B 10.3.6	Polyarthritits, chronische .....	A 5d pp; B 18.1; B 18.2.1
Parese .....	B 3.1.2	Polyneuropathien .....	B 3.11
Parkinson .....	B 3.1.2	Porphyrien .....	B 15.8
Pemphigus, Pemphigoide .....	B 17.6	Prostata .....	B 13.6
Penis .....	B 13.1	Psoriasis vulgaris .....	B 17.7
Persönlichkeitsstörung .....	B 3.7	Psyche .....	B 3
Pflegezulage .....	C 13	Psychisches Trauma .....	B 3.7
Pflegezulagestufen .....	C 13	Psychose .....	A 4f aa; B 3.6
Phenylketonurie .....	A 5d kk; B 15.4		
Plasmozytom .....	B 16.4		
<b>Q</b>		<b>Q</b>	
Quincke-Ödem .....	B 17.2		
<b>R</b>		<b>R</b>	
Rachenraum .....	B 7	Rhythmusstörungen .....	B 9.1.6
Rheumatische Erkrankungen .....	B 18; B 18.2.1	Riechvermögen .....	B 6.3
Rhinophym .....	B 17.4	Rosazea .....	B 17.4
		Rückenmarksschäden .....	B 3.9
<b>S</b>		<b>S</b>	
Sarkoidose .....	B 8.9	Schädigungsfolge, im Sinne der Verschlimmerung .....	C 5.3
Schädigung, gesundheitliche .....	C 2.1; C 3.3	Scheide .....	B 14.6
Schädigungsfolgen .....	A 1; C 2.1; C 3.3	Schilddrüse .....	B 15.6
Schädigungsfolge, im Sinne der Entstehung .....	C 5.2	Schizophrenie .....	B 3.6



## Stichwortverzeichnis

Schlaf-Apnoe-Syndrom.....	B 8.7	Skotom .....	A 6b ee; B 4.5
Schluckstörungen.....	B 7.7	Speiseröhre.....	B 10.1
Schlüsselbein.....	B 18.13	Sprue .....	A 5d ss; B 10.2.2
Schmerzen .....	A 2i+j	Sprunggelenk.....	B 18.14
Schulter.....	B 18.13	Stammzelltransplantation .....	B 16.8
Schwerhörigkeit .....	A 5d ee; B 5; D 1f; D 2b+c; D 4	Sterilität .....	B 14.2
Seelische Begleiterscheinung .....	A 2i	Stimmstörung .....	B 7.10
Sehbehinderung .....	A 6; A4e aa; A 5d dd;B4; D1+2	Stinknase.....	B 6.2
Sehorgan.....	B 4	Stoffwechsel .....	B 15
Sehschärfe .....	A 6; B 4	Strabismus .....	B 4.4

## T

## T

---

Tatsachen (zur Begutachtung des urs. Zusammenhangs).....	C 1; C 2	Tetanie.....	B 15.6
Taubheit.....	A 5d ee; B 5; D 1f; D 2b+c; D 4	Tinnitus.....	B 5.3
Teilhabe, Beeinträchtigung....	A 1; B 1; B 3; B 15; B 16; C 6	Tracheostoma .....	B 7.9
		Trigeminusneuralgie.....	B 2.2
		Tuberkulose .....	B 8.8

## U

## U

---

Ulcera (ventrikuli; duodeni) ...	B 10.2.1	Ursächlicher Zusammenhang Schädigung, Tod .....	C 10
Unterarm .....	B 18.13	Urtikaria .....	B 17.2
Unterschenkel.....	B 18.14		
Ursachen, konkurrierende .....	C 3.4.2		

<b>V</b>	<b>V</b>	
	Vagina .....	B 14.6
	Varikosis .....	B 9.2.3
	Varikozele .....	B 13.3
	Vaskulitiden .....	B 18.2.3
	Verdauungsorgane .....	B 10
	Verhaltensstörungen .....	B 3.5
	Verschiebung der Wesensgrundlage .....	A 7c
	Verwachsungen, Bauchfell ....	B 10.2.3
	Vitiligo .....	B 17.12
	Vulva .....	B 14.6
<b>W</b>	<b>W</b>	
	Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs. ....	C 3.4; C 4.5; C 10
	Wesentliche Änderung der Verhältnisse .....	A 7
	Wirbelsäule .....	B 18.9
<b>Z</b>	<b>Z</b>	
	Zahnverlust .....	B 7.4
	Zehe .....	B 18.14
	Zöliakie .....	A 5d ss; B 10.2.2
	Zuckerkrankheit ...	A 5d jj; B 15.1; D 1e
	Zwerchfellhernie .....	B 11.3
	Zystitis .....	B 12.2.1

Bürgertelefon

## ***Bürgertelefon***

**Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr**

**Sie fragen – wir antworten**

Rente:	<b>030 221 911 001</b>
Unfallversicherung/Ehrenamt:	<b>030 221 911 002</b>
Arbeitsmarktpolitik und -förderung:	<b>030 221 911 003</b>
Arbeitsrecht:	<b>030 221 911 004</b>
Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs:	<b>030 221 911 005</b>
Infos für Menschen mit Behinderungen:	<b>030 221 911 006</b>
Europäischer Sozialfonds/Soziales Europa:	<b>030 221 911 007</b>
Mitarbeiterkapitalbeteiligung:	<b>030 221 911 008</b>
Informationen zum Bildungspaket:	<b>030 221 911 009</b>
Informationen zum Mindestlohn:	<b>030 60 28 00 28</b>

**Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:**

E-Mail: [info.gehoerlos@bmas.bund.de](mailto:info.gehoerlos@bmas.bund.de)

Fax: 030 221 911 017

Gebärdentelefon: [www.gebaerdentelefon.de/bmas](http://www.gebaerdentelefon.de/bmas)

**[www.bmas.de](http://www.bmas.de) | [info@bmas.bund.de](mailto:info@bmas.bund.de)**

## ***Impressum***

### **Herausgeber:**

Bundesministerium für Arbeit und Soziales,  
Referat Information, Monitoring,  
Bürgerservice, Bibliothek  
53107 Bonn



Stand: Mai 2020

### **Wenn Sie Bestellungen aufgeben möchten:**

Best.-Nr.: K 710  
Telefon: 030 18 272 272 1  
Telefax: 030 18 10 272 272 1  
Schriftlich: Publikationsversand der Bundesregierung  
Postfach 48 10 09  
18132 Rostock  
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de  
Internet: <http://www.bmas.de>

### **Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:**

E-Mail: [info.gehoerlos@bmas.bund.de](mailto:info.gehoerlos@bmas.bund.de)  
Fax: 030 221 911 017  
Gebärdentelefon: [www.gebaerdentelefon.de/bmas](http://www.gebaerdentelefon.de/bmas)

**Satz/Layout:** Grafischer Bereich des BMAS, Bonn

**Druck:** Hausdruckerei des BMAS, Bonn

Wenn Sie aus dieser Publikation zitieren wollen, dann bitte mit genauer Angabe des Herausgebers, des Titels und des Stands der Veröffentlichung. Bitte senden Sie zusätzlich ein Belegexemplar an den Herausgeber.